PATHOLOGIES INFLAMMATOIRES - MICI

ÉPIDÉMIOLOGIE

Épidémiologie des MICI	<p>Crohn et rectocolite hémorragique 150000 patients en France 3.6 millions dans le monde Incidence en augmentation Gradient nord sud - Nord plus touché Gradient européen.</p> <p>Age jeune au diagnostic (entre 16 et 30 ans) - + formes pédiatriques et des sujets âgés Homme = femme Pas de guérison (si arrêt des ttt = rechute) Cause inconnue. - Pense que c'est un ensemble de facteurs intriqués (génétiques, environnementaux, excès TNF alpha)</p>
-------------------------------	--

CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES ET PARACLINIQUES

Maladie Crohn	<p>Inflammatoire chronique intestin Peut toucher la totalité du tube digestif - De l'œsophage jusqu'au rectum Avec principalement des localisations au niveau de l'iléon et au niveau du colon. Lésions transmursales - Elles touchent toute l'épaisseur de la paroi digestive ce qui peut entraîner des fistules et des sténoses</p>	
RCH	<p>Le rectum toujours atteint. Peut monter dans le reste du colon Ne touche jamais le grêle Lésion continue et superficielle (pas transmurale) Peut entraîner un risque de cancer.</p>	
Principales localisations des lésions digestives	Crohn	<p>Principalement colon et iléon terminal Mais aussi que l'iléon OU uniquement colon Et aussi lésions anopérinéales</p>
Principales localisations des lésions digestives	RCH	<p>Que rectum Colite distale G OU l'ensemble du colon (pancolique)</p>
Impact sur la vie des patients	Impact sur la qualité de vie des patients. 53% le pensent.	
Symptômes des MICI	<p>Douleurs abdominales Diarrhées chroniques Emission de glaires et de sang Amaigrissement, asthénie, fièvre</p> <p>Manifestations extra digestives :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Articulaires (spondylarthrite) - Cutanées - Oculaires - Foie (cholangite sclérosante primitive) 	
Lésions de l'anus et du périnée dans la maladie de Crohn	<p>Fistule et écoulement ano-périnéale - Complication de ces fistules → abcès, traité par des Setons (tubes qui permettent l'écoulement)</p>	

SCORES ET SÉVÉRITÉ

Crohn	<p>Index d'Harvey Bradshaw 0 à 30 - Inactive - Active - Active très sévère. Plus est élevé, plus important. Selles par jour, masse abdominale, douleurs, bilan état général.</p>	
Activité de la maladie	<p>Évolue entre des phases de poussées et de rémissions chez 89% des patients Ou en permanence active OU rémission prolongée spontanément sans ttt</p>

	Hospitalisation	8 à 9 jours
	Chirurgie	Environ 50% des patients à 10 ans
	Récidive post-op	1/3 des patients à 5 ans 50% des patients à 10 ans
	Double objectif des ttt	Rémission des symptômes Cicatrisation des lésions intestinales → Réduction du risque de rechute, réduction des complications (abcès, fistule, sténose), réduction du risque de chirurgie, réduction du risque d'hospitalisation
	Quantifier et surveiller la maladie	Douleur, fatigue CRP Biomarqueurs Endoscopie (ulcération, inflammation) Imagerie Complications
RCH	Score de Mayo 0 à 11 Cote une poussée de RCH Active, inactive et active très sévère → Selles Présence de sang dans les selles - Inférieure ou sup à 50% des émissions Activité de la maladie	
	Complications de la RCH ultime	La colite aigue grave Score de truelove and Witts - Émission de plus de 6 selles sanglantes par 24 heures associées à un autre signe systémique (FC >90, fièvre >37.8, anémie, CRP haute)

Ttt des MICI		
Stratégie progressive ou fort d'emblée	Début par des ttt moins fort ↓ - Dérivés aminosalicylés - Puis Corticoïdes - Immunosuppresseurs ↓ - En dernier recours : anti TNF alpha → De plus en plus on commence par les anti-TNF pour ensuite désescalader = fort d'emblée	
Anti TNF efficace dans les MICI	Anticorps dirigés contre les cytokines : inhibiteur du TNF alpha Check list à faire avant de commencer une thérapie par TNF (immunosuppresseur donc danger) Rémicade Humira Simponi (que l'amm dans la RCH et pas dans crohn)	
Ei des ttt	Réaction à l'injection	Infliximab ++
	Immunogénicité	Ac anti TNF Infliximab ++ Association d'immunosuppresseurs et les perfusions programmées baissent le risque de développement d'Ac
	Infection	Tuberculose : infliximab Infections opportunistes Hépatite B : risque de réactivation virale → traitement antiviral 2 à 4 semaines avant et jusqu'à l'arrêt du ttt.
Prévenir le risque d'infection opportuniste Avant la mise sous anti-TNF - Interrogatoire exhaustif - Examen clinique - Screening pour la tuberculose - Bilan bio et vaccination - Information du patient