Explorations urologiques et digestives

Généralités																
Avant l'examen	<p>Consultation pré anesthésie (minimum 48h avant) Consentement éclairé signé et joint au dossier À jeun Préparation cutanée préopératoire : douches bétadinées, linge propre, pas de bijou, ni prothèse, ni piercing, ni vernis... Prémédication selon prescription anesthésiste / protocole Pose d'une VVP. Si présente : vérification de la fonctionnalité</p>															
Après l'examen	<p>Installation du patient à son retour dans l'unité Identitovigilance Surveillance des paramètres vitaux Surveillances spécifiques selon l'examen subi et les risques liés</p>															
Imagerie																
Image par résonnance magnétique = IRM	<p>Stimulation des atomes d'hydrogène contenus dans l'eau de notre corps par un électro-aimant.</p>															
	<table border="1"> <tr> <td>Réalisation</td> <td> Sans injection Patient immobile Indolore, non invasif mais bruyant ++ Peut être couplée à une opacification des vaisseaux sanguins par un produit de contraste : angio-IRM </td> </tr> <tr> <td>Durée</td> <td>15 à 30 minutes</td> </tr> <tr> <td>Visualisation</td> <td>Ligaments , système nerveux central, muscles, cœur, certaines tumeurs...</td> </tr> </table>	Réalisation	Sans injection Patient immobile Indolore, non invasif mais bruyant ++ Peut être couplée à une opacification des vaisseaux sanguins par un produit de contraste : angio-IRM	Durée	15 à 30 minutes	Visualisation	Ligaments , système nerveux central, muscles, cœur, certaines tumeurs...									
	Réalisation	Sans injection Patient immobile Indolore, non invasif mais bruyant ++ Peut être couplée à une opacification des vaisseaux sanguins par un produit de contraste : angio-IRM														
	Durée	15 à 30 minutes														
Visualisation	Ligaments , système nerveux central, muscles, cœur, certaines tumeurs...															
Scanner	<p>Utilisation de rayons X pour réaliser des coupes du corps humain.</p> <table border="1"> <tr> <td>Réalisation</td> <td>Patient immobile, allongé sur le dos</td> </tr> <tr> <td>Durée</td> <td>15 à 40 min</td> </tr> </table>	Réalisation	Patient immobile, allongé sur le dos	Durée	15 à 40 min											
Réalisation	Patient immobile, allongé sur le dos															
Durée	15 à 40 min															
Explorations digestives																
Lavement baryté	<p>Examen radiologique du rectum et du colon par injection de baryte (produit radio opaque) dans le rectum, par une canule</p>															
	<table border="1"> <tr> <td>Préparation</td> <td>Colon vide donc préparation colique au préalable</td> </tr> <tr> <td>Durée</td> <td>45 min</td> </tr> <tr> <td>Risques</td> <td>Constipation due à la baryte, perforation par la canule</td> </tr> <tr> <td>Surveillances</td> <td>Transit, douleurs abdominales, saignements anaux</td> </tr> </table>	Préparation	Colon vide donc préparation colique au préalable	Durée	45 min	Risques	Constipation due à la baryte, perforation par la canule	Surveillances	Transit, douleurs abdominales, saignements anaux							
	Préparation	Colon vide donc préparation colique au préalable														
	Durée	45 min														
	Risques	Constipation due à la baryte, perforation par la canule														
Surveillances	Transit, douleurs abdominales, saignements anaux															
Cholangiopancréatographie rétrograde par voie endoscopique = CPRE	<p>Exploration des voies biliaires et pancréatiques par voie endoscopique haute, sous anesthésie générale, par opacification avec produit de contraste, sous contrôle radiologique.</p>															
	<table border="1"> <tr> <td>Préparation de l'AG et de l'exploration</td> <td colspan="2">À jeun, douche pré opératoire, prémédication, VVP, informations... Arrêt des anticoagulants et AAP, bilan sanguin (coag, NFP, groupage ABO), bilan d'anesthésie</td> </tr> <tr> <td>Durée</td> <td colspan="2">60 à 90 min</td> </tr> <tr> <td>Coût de réalisation</td> <td colspan="2">300 à 600 €</td> </tr> <tr> <td>Indications</td> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> - Exploratoire : mise en place d'un cathéter au niveau de la papille d'Oddi pour opacification □ visualisation d'obstacles : sténose, lithiase, tumeur - Interventionnel : prothèse, extraction de calculs </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Surveillances post examen</td> <td>Liées à l'anesthésie</td> <td>Surveillance hémodynamique (pouls, tension), surveillance réveil (état de conscience)</td> </tr> </table>	Préparation de l'AG et de l'exploration	À jeun, douche pré opératoire, prémédication, VVP, informations... Arrêt des anticoagulants et AAP, bilan sanguin (coag, NFP, groupage ABO), bilan d'anesthésie		Durée	60 à 90 min		Coût de réalisation	300 à 600 €		Indications	<ul style="list-style-type: none"> - Exploratoire : mise en place d'un cathéter au niveau de la papille d'Oddi pour opacification □ visualisation d'obstacles : sténose, lithiase, tumeur - Interventionnel : prothèse, extraction de calculs 		Surveillances post examen	Liées à l'anesthésie	Surveillance hémodynamique (pouls, tension), surveillance réveil (état de conscience)
Préparation de l'AG et de l'exploration	À jeun, douche pré opératoire, prémédication, VVP, informations... Arrêt des anticoagulants et AAP, bilan sanguin (coag, NFP, groupage ABO), bilan d'anesthésie															
Durée	60 à 90 min															
Coût de réalisation	300 à 600 €															
Indications	<ul style="list-style-type: none"> - Exploratoire : mise en place d'un cathéter au niveau de la papille d'Oddi pour opacification □ visualisation d'obstacles : sténose, lithiase, tumeur - Interventionnel : prothèse, extraction de calculs 															
Surveillances post examen	Liées à l'anesthésie	Surveillance hémodynamique (pouls, tension), surveillance réveil (état de conscience)

		Liées à l'examen	Dépister les éventuelles complications : <ul style="list-style-type: none"> - Hémorragie : surveillances cliniques et hémodynamiques - Douleur immédiate ou retardée de l'hypocondre droit avec défense abdominale et vomissements : perforation rétro péritonéale ? - Frissons, fièvre : angiocholite ? pancréatite ? 	
		Reprise de l'alimentation	Le lendemain, selon l'état clinique et les résultats biologiques (amylase, lipase)	
	Complications		Signes	Surveillances
		Angiocholite = inflammation des voies biliaires	Fièvre, frissons, douleurs abdos, ictère	Température, pouls, tension, douleurs abdos, coloration cutanée
		Pancréatite = inflammation du pancréas	Douleurs en barre épigastrique 3 à 5 heures après le geste et irradiantes dans le dos et l'épaule, gêne à la respiration, vomissements +++	Laisser à jeun, pouls, tension, température, dosage amylases et lipases, douleurs
		Perforation rétro-péritonéale	Douleur immédiate ou retardée de l'hypocondre droit, défense abdominale centrée sur l'hypocondre droit, vomissements	Douleurs, pouls, TA, vomissements, à jeun
		Hémorragie par traumatisme lors du geste	Hématémèse, méléna, pâleur, dyspnée, tachycardie et hypotension	Extériorisation de sang, pouls, TA, FR, SaO ₂ , NFP, bilan de coag
Gastroskopie	Endoscopie à visée diagnostique et/ou thérapeutique. Exploration de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum.			
	Préparation et réalisation	Patient à jeun strict de 6 heures Réalisée avec un endoscope souple, avec ou sans anesthésie générale Examen invasif par voie buccale ou nasale Non douloureux mais inconfortable		
	Durée	Diagnostique : 10 min Thérapeutique : 30 à 45 min		
	Surveillances post examen	Dépister des complications	Malaise vagal lié au jeûne Hémorragie : surveillance hémodynamique Douleur thoracique : penser à la perforation surtout si geste thérapeutique	
		Reprise de l'alimentation	Selon les indications	
Observation		Possibilité d'épistaxis lors de nasogastroskopie		
Facteurs douloureux ou source d'inconfort		Possible irritation de la gorge et du nez due au passage de l'endoscope		
Coloscopie	Endoscopie à visée diagnostique et/ou thérapeutique. Exploration par voie anale du rectum et du colon +/- de l'iléum			
	Préparation et réalisation	Sous anesthésie générale Régime sans résidu pendant 5 jours Purge laxative Contrôler l'élimination colique qui ne doit plus contenir de selles mais un liquide couleur " champagne "

	Durée	30 à 60 min	
	Surveillances post examen	Liées à l'anesthésie	Surveillance hémodynamique (pouls, tension), surveillance réveil (état de conscience)
		Liées à l'examen	Dépister des complications : <ul style="list-style-type: none"> - Douleur abdominale : Douleur musculaire ? Perforation ? - Ballonnement : Évacuation des gaz ? - Rectorragie : Filet de sang ? Caillot ? Hémorragie ?
Reprise de l'alimentation	Selon les indications S'assurer que l'évacuation des gaz a commencée		

La capsule vidéo-endoscopique pour l'intestin grêle

Capsule à avaler = de la taille d'une gélule d'antibiotique
Régime sans résidus durant les 2-3 jours précédant l'examen
Capsule capable de prendre 2 à 8 images /seconde puis les envoie vers un boîtier enregistreur. (Filme environ 50 000 images).
En ambulatoire après l'installation de l'appareil d'enregistrement. Après 7 heures environ, on considère que l'examen de l'intestin grêle est complet et le dispositif d'enregistrement est enlevé.
La capsule est éliminée par voie naturelle dans les 24 à 72 heures.

Injection d'un produit de contraste

Patient à jeun car risque d'allergie avec choc anaphylactique
Signes d'allergie : prurit, œdème, difficultés respiratoires, nausées
Pose d'une VVP : s'assurer de sa fonctionnalité pour éviter risque d'extravasation du produit de contraste
Informé le patient d'une éventuelle sensation de chaleur à l'injection du produit iodé
Surveillance post injection de produit de contraste
Hydratation ++ pendant 12 h : néphrotoxicité du produit de contraste (s'assurer qu'il n'y ai pas d'insuffisance rénale)
Arrêt des antidiabétiques oraux si possible

L'importance d'être à jeun lors d'une écho abdo

Les ultrasons émis par la sonde ne peuvent pas passer au travers d'un corps dur ou de gaz.
Les aliments non digérés contenus dans l'estomac et l'intestin risquent de faire écran, ce qui empêche aux ultrasons de passer → risque de renvoyer une image incorrecte ou incomplète des organes examinés

Explorations urologiques

Urographie intra veineuse = UIV

Injection IV d'un produit iodé puis clichés séquentiels de l'appareil urinaire qui permet de visualiser d'éventuels obstacles

Préparation	À jeun Pose d'une VVP fonctionnelle (attention extravasation) Si possible colon vide Biologie : créatinémie < 120 µmol/L et urée sanguine
Réalisation	Non douloureux Possible sensation de chaleur intense due au produit de contraste Possible sensation de mauvais gout dans la bouche
Durée	60 minutes
Cout	Environ 95 €
Surveillances	Hydratation ++ pendant 12 h : néphrotoxicité du produit de contraste Signes d'allergie : prurit, œdème, difficultés respiratoires, nausées

Cystographie

Introduction d'un système optique remplie de liquide, après anesthésie locale du méat, dans l'urètre et dans la vessie, afin d'en visualiser les parois

Préparation	ECBU < 48h négatif
Réalisation	Toilette génitale Pose de sonde urinaire Remplissage vessie avec produit de contraste iodé
Durée	60 min
Cout	75 €
Surveillances	Reprise mictionnelle Aspect des urines : risques infectieux et hémorragique

Cystoscopie	Exploration par endoscope de la paroi interne de l'urètre et de la vessie	
	Réalisation	AL pour les hommes
	Indications	Diagnostic de troubles urinaires Surveillance ou diagnostic d'une lésion de la vessie Détecter d'éventuelles anomalies de la muqueuse de la vessie ou de l'urètre Recherche cancer, polypes, inflammation, infection ou malformation de la vessie
	Durée	5 à 10 min