LES PRODUITS SANGUINS

DON DE SANG	
Produits sanguins labiles (PSL)	<p>1 don de sang total = 3 produits sanguins labiles</p> <p>Délivrance par l'EFS</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Concentrés de GR (CGR) ⇒ Concentrés plaquettaires (CP) ⇒ Plasma frais congelé (PFC) <p>Nécessité de groupages sanguins et RAAE</p> <p>Système de surveillance : hémovigilance</p> <p>Ordre perfusion : CP > PFC > CGR</p>
Médicaments dérivés du sang	<p>Dispensation = pharmacie</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Albumine ⇒ Immunoglobulines ⇒ Facteurs de coagulation ⇒ PFC SD (PFC industriel) <p>Pas de nécessité de phénotypes érythrocytaires sauf PFC SD et RAAE</p> <p>Système de surveillance = pharmacovigilance.</p>

CGR	
Indications	<p>= ANEMIE</p> <p>Le seuil transfusionnel dépend :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Du taux d'hémoglobine (Hb) ⇒ Du type d'anémie <ul style="list-style-type: none"> ○ Anémies carencielles (fer, vitamine B12) et auto-immunes (auto-Ac) : ne pas transfuser mais TTT étiologique ○ Aigue (< 48h) ou chronique ⇒ De l'état cardiaque et respiratoire, de la tolérance clinique ⇒ De l'existence ou non d'un saignement. <p>Sans ATCD cardiovasculaires, y compris patient > 80 ans : 70g/L</p> <p>ATCD cardiovasculaires : 80 à 90 g/L</p> <p>Hémopathie maligne, tumeurs solides : 80 g/L</p> <p>Intolérance clinique, insuffisance coronarienne aigue, IC avérée ou bêta-bloquée : 100 g/L</p>
En pratique	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Transfusion ABO, RH D iso groupe ou compatible <ul style="list-style-type: none"> ○ Phénotype érythrocytaire ABO RH D / RH-KEL1 ○ Recherche obligatoire d'anticorps anti-érythrocytaires ⇒ Durée de transfusion : 1 à 2h, en fonction de l'état clinique du patient, sans dépasser 3 heures (personnes âgées, insuffisants cardiaques, néonatalogie) ⇒ 1 ml = 15 gouttes ⇒ Filtre à transfusion ⇒ Réchauffeur de sang pour transfusion massive ou Ac froids.

CP	
Indications	<p>= THROMBOPENIE</p> <p>Pas de transfusion si > 100 milliards/L</p> <p>Le seuil transfusionnel dépend :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Du taux des plaquettes et du contexte clinique <ul style="list-style-type: none"> ○ Avant un acte invasif (préventif) si < 50 à 100 milliards/L ○ Syndrome hémorragique ⇒ Du type de thrombopénie : uniquement les thrombopénies d'origine centrale <ul style="list-style-type: none"> ○ Préventif : 10 milliards/L à 20 milliards/L ○ Anticoagulant, CIVD, geste invasif : 50 milliards/L ○ Curatif (syndrome hémorragique) quel que soit le taux des plaquettes

	Les thrombopénies d'origine périphérique : Contre-indication sauf syndrome hémorragique mettant en jeu le pronostic vital.
En pratique	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Transfusion iso groupe ABO et iso RH (carte de groupe) ⇒ Posologie selon le poids du patient ⇒ En 30 mn, de préférence dès la réception dans le service ⇒ Filtre à transfusion ⇒ Recommandation : transfusion dès que possible ⇒ Choix du produit : 2 produits qui ont la même efficacité thérapeutique <ul style="list-style-type: none"> ○ En général : mélange de concentrés de plaquettes (MCP) ○ Concentrés de plaquettes par aphérèse (CPA) pour les patients ayant des Ac anti HLA ou anti plaquettes ○ En fonction du stock à l'EFS.

PFC	
Indications	<p>= TROUBLE DE LA COAGULATION</p> <p>Syndrome hémorragique modéré : en fonction du TP si < 40%</p> <p>Choc hémorragique en fonction de la clinique, sans attendre les résultats de la biologie</p> <p>Coagulopathie de consommation (CIVD) grave</p> <p>Surdosage en AVK si aucun médicament dérivé du sang disponible</p> <p>NON indications :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Remplissage ⇒ Trouble de coagulation <ul style="list-style-type: none"> ○ Si le facteur de coagulation manquant existe (MDS) ○ En l'absence de saignement même en cas de geste invasif (pas de transfusion préventive)
En pratique	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Choix du PFC (plusieurs types en fonction du mode de préparation ou du TTT inactivant les microorganismes, tous ont la même activité thérapeutique) <ul style="list-style-type: none"> ○ En fonction des ATCD du patient (allergie) ○ En fonction du stock à l'EFS ⇒ Transfusion iso groupe ABO (carte de groupe) ⇒ Décongélation par l'EFS : 1/2h (Anticipation si urgence) ⇒ Filtre à transfusion ⇒ Durée : 20 mn ⇒ Recommandation : transfusion dès que possible

MDS	
Indications	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Albumine : hypovolémie : <ul style="list-style-type: none"> ○ Chez le nouveau-né : hypo albuminémie, prévention de l'ictère nucléaire, troubles hémodynamiques, maladie congénitale de la bilirubine. ⇒ Facteurs de coagulation : fibrinogènes, VII, VIII, IX, XI..., déficits congénitaux, acquis ⇒ Immunoglobulines <ul style="list-style-type: none"> ○ Polyvalentes : déficits immunitaires, TTT immuno modulateur ○ Spécifiques : anti hépatite B, anti tétanique, anti D, prévention de la maladie hémolytique du nouveau-né chez la femme RH D négatif accouchant d'une enfant RH D positif ⇒ PFC SD : en fonction de l'organisation de l'établissement de santé (échanges plasmatiques)
En pratique	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Prévention des réactions allergiques : antihistaminique ⇒ Remise à température ambiante si stockage réfrigérateur ⇒ Perfuseur débit lent au début ⇒ Surveillance +++ ⇒ Traçabilité
EI	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Céphalées, nausées, vomissements ⇒ Frissons, allergie (cutanée, bronchospasme) ⇒ Insuffisance rénale aigue <p>Conduite à tenir : arrêt perfusion, appel médecin, TTT symptomatique, surveillance diurèse, créatininémie, hydratation, déclaration en pharmaco vigilance.</p>