



Maladie de Lyme

LA MALADIE	
Physiopathologie	La piqûre de tique provoque une infection bactérienne non contagieuse
Épidémiologie	Une controverse à ce sujet. De nombreux spécialistes souhaiteraient que cette maladie soit classée comme une épidémie. Il semblerait que la prévalence de la maladie soit sous-estimée. Il pourrait avoir 90% de porteurs de la bactérie en Europe. D'après l'institut de veille sanitaire française il y a 27 000 nouveaux cas par an. Absente du littoral méditerranéen.
Les complications possibles	Sans prise en charge thérapeutique, des atteintes chroniques peuvent perdurer de façon invalidante.
DIAGNOSTIC	
Clinique	Une fois l'ablation de la tique, il faut surveiller : douleurs articulaires, hyperthermie, asthénie, céphalée, érythèmes, troubles neurologiques, troubles visuels.
Biologique	Sérologie sur la présence d'anticorps. La PCR est la seule analyse complémentaire utile , c'est un diagnostic indirect. Pas de marqueur direct.
TRAITEMENTS	
Médicamenteux	Aucun traitement si aucun symptôme . Forme aigüe : traitement par antibiothérapie de 21 jours (amoxicilline en première intention puis doxycycline dans un second temps)
Non médicamenteux	Retrait de la tique , désinfection de la zone, et surveillance pendant 30 jours.

