

MÉMO : Les anticoagulants et antiagrégants plaquettaire



Classe thérapeutique	Antiagrégants plaquettaire	Anticoagulants			
		AVK	HNF	HBPM	NACO
Spécialités / Noms / Voie	<i>PO</i> : Kardegic / Plavix / Persantine / Ticlid	<i>Per os</i> : Sintrom / Mini-Sintrom / Coumadine / Préviscan	<i>Voie IV</i> : Heparine sodique <i>Voie SC</i> : Calciparine	<i>Voie SC</i> : Fraxiparine / Fraxodi / Lovenox / Innohep / Fragmine	<i>Voie SC</i> : Arixtra <i>Per os</i> : Xarelto / Pradaxa
Pharmacocinétique	Délai d'action : 24 à 48h Imprégnation longue	<u>Délai d'action</u> Sintrom / Mini-sintrom 8h PréviSC / CoumaD 30-45h <u>Durée d'action</u> Sintrom / Mini-S 1 à 2j Préviscan / Coumadine 3j	<u>Délai d'action</u> En IV : immédiat En SC : 1h <u>Durée d'action</u> IV : 2 à 4h SC : 8 à 12h	<u>Délai d'action</u> : 3 à 6h <u>Durée d'action</u> : 24h	Délai d'action rapide
Surveillance bio et objectif		<u>TP</u> 2 à 4,5 fois moins que témoin donc 22% < TP < 50% Norme : 100% <u>INR</u> Norme 1 Modérée : INR entre 2 et 3 Élevée : INR entre 3 et 4.5	<u>TCA</u> 2 à 3 fois le temps du témoin soit 60 à 96 sec Norme = 30 à 32" <u>Héparinémie</u> 0,2-0,5 UI/ml Normes < 0,2 UI/ml	<u>Héparinémie</u> : <u>Norme</u> < 0,2 UI/ml <u>Ttt préventif</u> : 0,2 à 0,4 UI/ml <u>Ttt curatif</u> : 0,5 à 1 UI/ml	
Surdosage biologique		<u>TP</u> < 20% <u>INR</u> > 5	<u>Plaquette</u> diminue > 50% de la valeur de base <u>TCA</u> > 100" <u>Héparinémie</u> > 0,6 UI/ml	<u>Ttt préventif</u> : > 0,5 UI/ml <u>Ttt curatif</u> : >1 UI/ml <u>Plaquette</u> diminue > 50% de la valeur de base	
Quand contrôler		<u>TP-INR</u> : -1er contrôle 36h après la 1ère prise, -puis tous les 1 ou 2 jours jusqu'à l'équilibre, -puis 1 fois par semaine -puis 1 fois par mois minimum	<u>HÉPARINE IV</u> : -1er contrôle 4 h à 6h après le début ou après tout changement de PM <u>CALCIPARINE SC</u> : -1er contrôle à mi-distance de 2 injections (4 à 6h), puis après tout changement de dosage	<u>Héparinémie</u> : - 3 à 4h après injection 1 ^{ère} inject° (sauf INNOHEP et FRAXODI 5 à 6h) - 3 à 4h après changement PM - puis tous les jours en fonction PM 3 à 4h après inject°	
Antidote		Vitamine K / PPSB	Sulfate de protamine	Sulfate de protamine	

