



ABACAVIR® : Antirétroviral.

Indications : Ce médicament est un antirétroviral actif sur le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Il est utilisé, en association avec d'autres médicaments antirétroviraux, dans le traitement des adultes et des enfants infectés par le VIH.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	X / ZIAGEN®.
Excipient notable	Alcool polyvinylique, Cellulose microcristalline, Fer jaune oxyde, Macrogol, Magnésium stéarate, Silice colloïdale anhydre, Sodium carboxyméthylamidon, Talc, Titane dioxyde.
Contre-indications	Antécédent d'allergie à l'Abacavir, insuffisance hépatique grave.
Fertilité Grossesse Allaitement	Non connu. L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu. Si une grossesse survient au cours du traitement, prévenez votre médecin. L'infection par le VIH contre-indique l'allaitement.
Posologie	Les comprimés doivent être idéalement avalés tels quels. Néanmoins pour les patients qui n'arrivent pas à les avaler, il est possible de les écraser et de les mélanger à une petite quantité de nourriture semi-solide ou de liquide, puis d'ingérer l'ensemble immédiatement. - Enfant de plus 3 mois et pesant moins de 25 kg : la dose est fonction du poids de l'enfant. - Enfant de 14 à 20 kg : 300 mg par jour, répartis-en une ou deux. - Enfant de 20 à 25 kg : 450 mg, répartis-en une ou deux prises. - Adulte et enfant de plus de 25 kg : 2 comprimés par jour, répartis-en une ou deux prises. Voie per os, comprimé sécable.

EFFETS

Attendus	Bloque une enzyme du virus, appelée transcriptase, afin d'empêcher sa reproduction dans les cellules infectées, sans toutefois l'éliminer.
Indésirables	Fréquent : maux de tête, perte d'appétit, nausées, vomissements, diarrhées, éruption cutanée, fatigue, fièvre, torpeur. Très rare : pancréatite, acidose lactique.
Surdosage	X.
Conduite 🚗	X.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	L'association de ce médicament avec la méthadone ou la ribavirine peut nécessiter une surveillance particulière.
Autres produits	X.

