



ABILIFY® ; Neuroleptique atypique.

Indications : Neuroleptique dit "atypique" qui a des propriétés antipsychotiques. Certains de ses effets indésirables sont moins marqués que ceux des neuroleptiques classiques. Il est utilisé dans le traitement de la schizophrénie ou dans le cadre d'un trouble bipolaire pour traiter les épisodes maniaques et pour prévenir les récives.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	Aripiprazole®.
Excipient notoire	Aucuns.
Contre-indications	En cas de survenue d'une fièvre inexplicquée associée à une raideur musculaire, ne poursuivez pas le traitement sans avis médical : risque de syndrome malin. Des précautions sont nécessaires en cas de diabète, d'épilepsie, de maladie cardiaque, de tension artérielle anormale, risque de thrombose, difficultés à avaler, d'antécédent d'addiction aux jeux d'argent, démence chez une personne âgée.
Fertilité Grossesse Allaitement	Non connu. Déconseillé. Déconseillé.
Posologie	Un surdosage en insuline peut provoquer une hypoglycémie sévère, pouvant se prolonger et menacer le pronostic vital.

EFFETS

Attendus	Contrôler efficacement la maladie.
Indésirables	Fréquent : maux de tête, fatigue, nausées, vomissements, digestion difficile, constipation, salivation excessive, étourdissement, insomnie, agitation, anxiété, somnolence, tremblements et vision trouble. Peu fréquent : hypotension orthostatique (sensation de vertige lors du levé), état dépressif. Fréquence indéterminée : palpitations, apparition ou aggravation d'un diabète, prise de poids, anorexie, nervosité, idées suicidaires, trouble de l'élocution, éruption cutanée, transpiration excessive, crampes, raideurs ou douleurs musculaires, difficulté à uriner, hypertension artérielle, accident thromboembolique, réaction allergique.
Surdosage	Risque si > 1260mg.
Conduite 🚗	X.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne, primidone, griséofulvine, rifabutine, rifampicine, millepertuis, kétoconazole, itraconazole, quinidine, fluoxétine, paroxétine, antiprotéases. Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un antihypertenseur, d'autres sédatifs (tranquillisants, somnifères) ou un antidépresseur.
Autres produits	X.

