




ABSTRAL® ; antalgique dérivé de la morphine.

Indication : Traitement des accès douloureux paroxystiques chez les patients adultes utilisant des morphiniques pour traiter les douleurs chroniques d'origine cancéreuse. L'accès douloureux paroxystique est une exacerbation passagère d'une douleur chronique par ailleurs contrôlée par un traitement de fond.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	FENTANYL®.
Excipient notoire	Mannitol (E421), cellulose microcristalline silicifiée, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.
Contre-indications	Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients ; patients non traités par un traitement de fond morphinique, car risque accru de dépression respiratoire ; dépression respiratoire sévère ou pathologies pulmonaires obstructives sévères ; traitement de la douleur aiguë autre que les accès douloureux paroxystiques.
Fertilité Grossesse Allaitement	Des études effectuées chez l'animal ont mis en évidence une toxicité sur la reproduction, avec une diminution de la fertilité. Le fentanyl doit être utilisé au cours de la grossesse uniquement en cas de nécessité absolue. Peut entraîner une sédation et une dépression respiratoire chez le nourrisson.
Posologie	Réservé aux patients considérés comme tolérants au traitement morphinique de fond de la douleur cancéreuse chronique. Peuvent être considérés comme tolérants aux morphiniques les patients recevant au moins 60 mg de morphine par jour par voie orale, au moins 25 µg de fentanyl par heure par voie transdermique, au moins 30 mg d'oxycodone par jour par voie orale, au moins 8 mg d'hydromorphone par jour par voie orale ou une dose équianalgésique d'un autre morphinique depuis une semaine minimum. Voie per os, comprimé sublingual.

EFFETS

Attendus	Diminuer la douleur.
Indésirables	Très fréquent : Nausées. Fréquent : Vertiges, céphalées, somnolence, dyspnée, fatigue, hyperhidrose, stomatite, vomissements, constipation, sécheresse buccale. Peu fréquent : Hypersensibilité, diminution de l'appétit, dépression, paranoïa, état confusionnel, désorientation, anxiété, troubles de l'attention, insomnie, tremblement, troubles du sommeil, vision floue, tachycardie, bradycardie, hypotension, douleur abdominale, gêne gastrique, dysfonctionnement érectile, asthénie, arthralgies, allergies. Fréquence indéterminée : Hallucinations, délires, diminution du niveau de conscience, dépression respiratoire, diarrhée, urticaire.
Surdosage	Possible, identique que la morphine donc antidote NALOXONE, à utiliser sous haute surveillance et avec des précautions.
Conduite 	Pas d'étude mais même effets que les opioïdes donc déconseillé.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Macrolides, antifongiques imidazolés, antimycobactériens, antiépileptiques, produits à base de plantes, autres dérivés morphiniques, anesthésiques généraux, myorelaxants, antidépresseurs sédatifs, antihistaminiques H1 sédatifs, barbituriques, anxiolytiques (benzodiazépines), hypnotiques, neuroleptiques, clonidine et substances apparentées, médicaments sérotoninergiques.
Autres produits	Jus de pamplemousse.

