



ACAMPROSATE® ; Dépendance alcoolique.

Indications : Maintien de l'abstinence chez le patient "alcoolo-dépendant". Il doit être associé à la prise en charge psychologique.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	ACAMPROSATE CALCIQUE®.
Excipient notoire	Cellulose microcristalline, povidone, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, acide méthacrylique et acrylate d'éthyle, talc, propylène glycol.
Contre-indications	Hypersensibilité à l'acamprosate ou à l'un des excipients, insuffisance rénale, allaitement.
Fertilité Grossesse Allaitement	Pas d'étude. Pas d'étude. Déconseillé.
Posologie	- 2 cps le matin, le midi et le soir, pour un sujet de poids supérieur à 60kg ; - 2 cps le matin, 1 cp le midi et 1 cp le soir pour un sujet de poids inférieur à 60kg sur une durée d'un an. Le ttt doit être instauré dès que possible après l'arrêt de la consommation d'alcool. Doit être administré à distance des repas si la tolérance digestive est bonne. S'ils sont pris au cours du repas, cela diminue la biodisponibilité du médicament. Voie per os, comprimé pelliculé gastro résistant.

EFFETS

Attendus	Diminuer la dépendance alcoolique et diminuer l'absorption volontaire d'alcool.
Indésirables	Très rare : Réactions d'hypersensibilité comprenant urticaire, œdème de Quincke, réaction anaphylactique. Rare : Augmentation de la libido. Très fréquent : Diarrhée. Fréquent : Douleurs abdominales, nausées, vomissements, flatulences, prurit, frigidité, impuissance, diminution de la libido. Fréquence indéterminée : Eruptions vésico-bulleuses.
Surdosage	Si surdosage, diarrhée.
Conduite 🚗	X.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	X.
Autres produits	X.

