




ACARIZAX® ; Immunothérapie allergénique.

Indications : Indiqué chez les patients qui, sur la base d'un diagnostic réunissant une histoire clinique évocatrice et la positivité d'un test de sensibilisation aux acariens de la poussière de maison.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	Dermatophagoides farinae®.
Excipient notoire	Gélatine (à base de poisson), mannitol, hydroxyde de sodium.
Contre-indications	Hypersensibilité à l'un des excipients, VEMS < 70% de la valeur théorique (après un traitement médicamenteux adapté) lors de l'initiation du traitement, Exacerbation sévère d'asthme au cours des 3 derniers mois, Infection aiguë des voies respiratoires chez les sujets asthmatiques, Maladies auto-immunes évolutives ou mal contrôlées, déficits immunitaires, immunodépression ou maladies néoplasiques malignes évolutives, Inflammation buccale aiguë sévère ou plaies de la muqueuse buccale.
Fertilité Grossesse Allaitement	Aucunes données cliniques. Aucunes données cliniques. Aucunes données cliniques.
Posologie	1 lyophilisat oral/jour. L'apparition de l'effet clinique est attendue 8 à 14 semaines après l'instauration du traitement. Les recommandations thérapeutiques internationales préconisent une durée d'immunothérapie allergénique d'environ 3 ans pour modifier l'évolution de la maladie. Les données d'efficacité sont visibles sur une période de 18 mois de traitement. Voie orale, Lyophilisat oral.

EFFETS

Attendus	Modifier la réponse immunitaire de l'individu à ces allergènes.
Indésirables	Très fréquent : Rhinopharyngite, prurit auriculaire, irritation de la gorge, œdème labial, œdème buccal, prurit oral. Fréquent : Bronchite, pharyngite, rhinite, sinusite, dysgueusie, prurit oculaire, asthme, dysphonie, dyspnée, douleur oropharyngée, œdème pharyngé, douleur abdo, diarrhée, dysphagie, dyspepsie, reflux gastro-œsophagien, glossite, ulcération buccale, douleur buccale, nausées, paresthésie buccale, œdème, prurit, urticaire, gêne thoracique, fatigue. Peu fréquent : Laryngite, réaction anaphylactique, sensation vertigineuse, paresthésie, conjonctivite allergique, palpitations, congestion nasale, rhinorrhée, sécheresse buccale, irritation œsophagienne, hypertrophie des glandes salivaires, hypersécrétion salivaire. Rare : Œdème laryngé, obstruction nasale, œdème de la trachée, angio-œdème.
Surdosage	Si les doses supérieures à la dose quotidienne recommandée sont prises, le risque d'effets indésirables augmente, y compris le risque de réactions allergiques systémiques ou de réactions allergiques locales sévères.
Conduite 	X.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Aucune étude d'interaction n'a été réalisée mais administration concomitante de traitements symptomatiques de l'allergie peut augmenter la tolérance clinique de l'immunothérapie allergénique, ce qui doit être pris en considération à l'arrêt de ces médicaments.
Autres produits	X.

