



## ACETATE® ; Anti-androgènes et anti-gonadotrope.

**Indications : Traitement palliatif anti-androgénique du cancer de la prostate. Hirsutismes féminins majeurs non tumorale (idiopathique, syndrome des ovaires polykystiques), lorsqu'ils retentissent gravement sur la vie psycho-affective et sociale.**

### LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	Cyproterone acetate®.
Excipient notoire	Lactose.
Contre-indications	Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients, tumeurs hépatiques (sauf métastases d'un cancer de la prostate), syndrome de Dubin-Johnson, syndrome de Rotor, tuberculose et maladies cachectisantes (hors cancer de la prostate), existence ou antécédents d'accidents thromboemboliques, dépression chronique sévère, anémie, antécédents d'herpès gestationis, existence ou antécédents de méningiomes.
Fertilité Grossesse Allaitement	Non connu. Déconseillé. Déconseillé.
Posologie	<b>Chez l'homme :</b> Dans le cancer de la prostate : 200 à 300mg, soit 4 à 6 cps/jour sans interruption. <b>Chez la femme :</b> Les femmes enceintes ne doivent pas prendre ce traitement. En période d'activité génitale, le traitement doit être associé à un estrogène. <b>Dose d'instauration du traitement :</b> *Du 1 <sup>er</sup> au 20 <sup>e</sup> jour du cycle : prendre 1 cp/jour associé à de l'estradiol ou du valérate d'estradiol avec un contraceptif local supplémentaire pendant les deux premiers cycles. *Du 21 <sup>e</sup> au 28 <sup>e</sup> jour du cycle : ne prendre aucun traitement. <b>Dose d'entretien :</b> 1 cp/jour ou réduction de la dose à ½ cp/jour en fonction des signes cliniques pendant les 20 jours de prise. En cas d'absence de saignement de privation pendant les 8 jours sans traitement, l'absence de grossesse devra être confirmée par un test immunologique. En cas d'oubli, si l'heure de prise est dépassée de plus de 12h, l'action contraceptive n'est plus garantie ; mesures contraceptives supplémentaires jusqu'à la fin du cycle en cours. Voie, comprimé sécable.

### EFFETS

Attendus	Chez l'homme : empêche l'action des androgènes sécrétés par les testicules et les cortico-surrénales. Chez la femme : l'hyperpilosité pathologique que l'on rencontre dans l'hirsutisme est très réduite, de même que l'hyperfonctionnement des glandes sébacées.
Indésirables	<b>Chez l'homme :</b> Inhibition de la spermatogenèse, gynécomastie habituellement réversible à l'arrêt du traitement, impuissance, baisse de la libido. <b>Chez la femme :</b> Troubles des règles du type saignements intercurrents ou aménorrhée, inhibition de l'ovulation, tension mammaire, augmentation ou diminution de la libido. <b>Les 2 :</b> anémie, variation de poids, dyspnée, thromboembolies, céphalées, insuffisance hépatique, asthénie, bouffées de chaleur/sudation, réaction d'hypersensibilité.
Surdosage	X.
Conduite 🚗	Si EI ressentit, ne pas conduire.

### INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Millepertuis, ulipristal, pérampanel, inducteurs enzymatiques, inhibiteurs de protéases boostés par ritonavir, bosentan.
Autres produits	X.

