




TANGANILPRO® ; Anti-vertigineux.

Indications : Traitement symptomatique de la crise vertigineuse.

LE MÉDICAMENT

| | |
|-----------------------|--|
| Molécule active / DCI | ACETYL-LEUCINE ®. |
| Excipient notoire | Amidon de maïs prégélatinisé, carbonate de calcium lourd, stéarate de magnésium. |
| Contre-indications | Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. |
| Fertilité | Déconseillé. |
| Grossesse | Déconseillé. |
| Allaitement | Déconseillé. |
| Posologie | 1,5 à 2g/jour, soit 3 à 4 cps/ jour en deux prises matin et soir. La durée du ttt est variable selon l'évolution clinique (entre 10 jours et 5 à 6 semaines) ; peut être augmentée sans inconvénient jusqu'à 3 g et même 4 g par jour si inefficacité. Voie orale, comprimé. |

EFFETS

| | |
|--|---|
| Attendus | Diminuer/supprimer les vertiges. |
| Indésirables | Très Rare : éruptions cutanées (parfois associées à un prurit), urticaire. |
| Surdosage | X. |
| Conduite  | X. |

INTÉRACTIONS

| | |
|-----------------|----|
| Médicamenteuses | X. |
| Autres produits | X. |

