



ZOVIRAX® ; Antiviraux.

Indications : Prévention des infections à Virus Herpes Simplex chez les sujets immunodéprimés, immunocompétent, traitement des infections herpétiques cutanées ou muqueuses sévères, prévention des récurrences d'infections oculaires, chirurgie de l'œil.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	ACICLOVIR®.
Excipient notoire	Cellulose microcristalline, carboxyméthylamidon sodique, povidone, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre.
Contre-indications	Hypersensibilité à la molécule active, valaciclovir ou à l'un des excipients.
Fertilité Grossesse Allaitement	Voir étude clinique. Déconseillé. Déconseillé.
Posologie	Réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans. Immunodéprimé : 4 cps/jour, à prendre à intervalles réguliers jusqu'à l'arrêt du traitement. Infections cutanées ou muqueuses : 5 cps/jour, à intervalles réguliers, pdt 5 à 10 jours. Le traitement devra être initié le plus tôt possible après infection. Infections à Virus Herpès Simplex : 4 cps/jour, en 2 prises. Le traitement sera revu 6 à 12 mois après, afin d'évaluer l'évolution naturelle de la maladie. Prévention récurrences d'infections oculaires à HSV : 4 cps à 200mg/jour, en 2 prises. Le traitement sera revu 6 à 12 mois après, afin d'évaluer l'évolution naturelle de la maladie. Chirurgie de l'œil : 4 cps à 200mg/jour, en 2 prises. Infections oculaires à HSV : 10 cps à 200mg/jour, en 5 prises. Le traitement devra être initié le plus tôt possible après infection. Insuffisance rénale sévère : 200mg, 2 fois/jour avec intervalle de 12h entre les prises. Boire beaucoup d'eau. Voie orale, comprimé.

EFFETS

Attendus	Inhibition de la synthèse de l'ADN viral.
Indésirables	Très fréquent : Céphalées. Fréquent : Sensations ébrieuses, nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, augmentations réversibles de la bilirubine et des enzymes hépatiques sériques, prurit, augmentation de l'urée et de la créatinine sanguines. Fréquence indéterminée : Thrombopénie, leucopénie, réactions anaphylactiques, dyspnées, atteinte hépatique aiguë, insuffisance rénale aiguë, notamment chez le sujet âgé ou insuffisant rénal en cas de dépassement de la posologie, douleur rénale, asthénie, hyperthermie. Rare : Eruptions cutanées, urticaire.
Surdosage	Des surdosages accidentels et répétés pendant plusieurs jours sont associés à des effets gastro-intestinaux (nausées, vomissements) et neurologiques (céphalées, confusion).
Conduite 	Aucunes études, si EI ne pas conduire.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Autres médicaments néphrotoxiques, tout médicament administré simultanément peut augmenter les concentrations plasmatiques, probénécide, cimétidine.
Autres produits	X.



