



ACIDE FUSIDIQUE® ; Antibactérien local.

Indications : Infections de la peau (staphylocoque et streptocoque), impétigos et dermatoses en traitement local uniquement pour lésions d'appoint en association à une antibiothérapie générale, désinfection des gîtes microbiens cutanéomuqueux.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	ACIDE FUSIDIQUE®.
Excipient notoire	Butylhydroxyanisole, alcool cétylique, sorbate de potassium.
Contre-indications	Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.
Fertilité	Aucunes études.
Grossesse	X.
Allaitement	X.
Posologie	Applications locales, après nettoyage de la surface infectée sur lésions suintantes, macérées, et des plis (avec ou sans pansement) 1 à 2 fois/jour, pendant 1 semaine. Eviter en couche épaisse. Voie cutanée, crème.

EFFETS

Attendus	Destruction des bactéries présente.
Indésirables	Peu fréquent : Dermate, rash, prurit, érythème, douleur/irritation au site d'application. Rare : Hypersensibilité, conjonctivite, œdème de Quincke, urticaire, phlyctène.
Surdosage	Peu probable.
Conduite 🚗	X.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Aucunes études.
Autres produits	X.

