




BONVIVA® ; Ostéoporose.

Indications : Traitement de l'ostéoporose post-ménopausique chez la femme à risque augmenté de fracture.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	ACIDE IBANDRONIQUE ®.
Excipient notoire	Chaque cp pelliculé contient 150 mg de sel sodique monohydraté.
Contre-indications	Hypersensibilité à la molécule active ou à l'un des excipients, hypocalcémie, anomalies de l'œsophage ralentissant le transit œsophagien (sténose, achalasie), incapacité à rester en position assis ou debout pendant au moins 60 minutes.
Fertilité Grossesse Allaitement	Déconseillé. Déconseillé. Déconseillé.
Posologie	1 cp de 150mg 1 fois/mois. Doit être pris le matin à jeun d'au moins 6h et 1h avant la première prise alimentaire, de boissons, d'autres médicaments ou suppléments par voie orale. Doit être supplémenté en calcium et/ou en vitamine D si apports alimentaires insuffisants. Toujours le prendre à la même date chaque mois. En cas d'oubli de prise, prendre un cp le lendemain matin du jour où l'oubli est constaté. Si nécessité de poursuivre le traitement, doit être réévaluée régulièrement. Voie orale, comprimé pelliculé.

EFFETS

Attendus	Action sélective sur le tissu osseux et inhibition de l'activité des ostéoclastes sans affecter la formation osseuse.
Indésirables	Fréquent : Céphalées, Œsophagite, gastrite, reflux gastro-œsophagien, dyspepsie, diarrhées, douleurs abdominales, nausées, Eruption cutanée, Arthralgies, myalgies, douleurs musculosquelettiques, crampe/raideur musculaire, syndrome pseudo-grippal. Peu fréquent : Sensation vertigineuse, ulcérations, sténoses de l'œsophage, dysphagie, vomissements, flatulences, douleur dorsale, asthénie. Rare : Hypersensibilité, inflammation oculaire, duodénite, angio-œdème, œdème de la face, urticaire, fractures fémorales atypiques sous trochantériennes et diaphysaires. Très Rare : Réaction/choc anaphylactique, syndrome de Stevens-Johnson, érythème polymorphe, dermatite bulleuse, ostéonécrose de la mâchoire, ostéonécrose du conduit auditif externe.
Surdosage	Embarra gastrique, dyspepsie, œsophagite, gastrite ou ulcère, hypocalcémie. Du lait ou des antiacides doivent être administrés car risque d'irritation œsophagienne. Eviter d'induire des vomissements. Doit rester verticalement.
Conduite 	X.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	X.
Autres produits	Calcium, lait, l'aluminium, le magnésium, le fer.

