



## SURGAM® ; Anti-Inflammatoire Non Stéroïdien.

**Indications : Traitement au long cours : Rhumatismes inflammatoires chroniques (polyarthrite rhumatoïde), arthroses douloureuses et invalidantes.**  
**Traitement de courte durée : Poussées aiguës d'arthrose, lombalgies, affections aiguës post-traumatiques, dysménorrhées, douleur inflammatoires ORL et stomatologiques.**

### LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	ACIDE TIAPROFENIQUE®
Excipient notable	Lactose.
Contre-indications	A partir 5 mois de grossesse révolus d'aménorrhée, atcds d'allergie ou asthme, hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients, atcds d'hémorragie/perforation digestive ou en cours, atcds d'ulcère peptique, insuffisance hépatocellulaire/rénale/cardiaque, enfant de moins de 15kg.
Fertilité Grossesse Allaitement	Déconseillé. Déconseillé. Déconseillé.
Posologie	<b>Adulte :</b> <b>Traitement d'attaque :</b> 2 cps à 100mg, 3 fois/jour. A partir du 4 <sup>e</sup> jour, possible de réduire à 3 ou 4 cps de 100mg/jour. <b>Pédiatrie :</b> <b>Enfants à partir de 15kg :</b> 10mg/kg/jour. <b>De 15kg à 20kg (de 4 à 6 ans) :</b> Soit ½ cp de 100mg, 3 fois/jour. Soit 1 cp de 100mg, 2 fois/jour suivant l'âge et le poids. <b>De 20kg à 30kg (de 6 à 10 ans) :</b> 1 cp de 100mg, 2 à 3 fois/jour. <b>A partir de 30kg (10 ans) :</b> 1 cp de 100mg, 3 fois/jour. Doit être pris au cours des repas avec un grand verre d'eau. Répartir en 2 à 3 prises/jour. Voie orale, comprimé sécable.

### EFFETS

Attendus	Antalgique, anti-inflammatoire, antipyrétique et immunosuppresseur.
Indésirables	<b>Très fréquent :</b> Douleur abdominale. <b>Fréquent :</b> Nausées, vomissements, dyspepsie, diarrhées, constipation, gastrites, crise d'asthme, rash, urticaire prurit, cystite, insuffisance rénale, anomalie des tests hépatiques. <b>Fréquence indéterminée :</b> Troubles urinaires, hématurie, maladie de Crohn, ulcères peptiques, perforation/hémorragie gastro-intestinales, œdème, HTA, insuffisance cardiaque, malaise, œdème de Quincke, photosensibilité, vertiges, hyperkaliémie, thrombocytopénie, anémie. <b>Rare :</b> Tachycardie, douleur thoracique, arythmie, hypotension, insuffisance cardiaque. <b>Très Rare :</b> Réactions bulleuses.
Surdosage	Risque gastro-intestinal -> évacuation rapide par lavage gastrique sur surdosage massif.
Conduite	Risque potentiel de vertiges, ne pas conduire si symptôme.

### INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Autres AINS, acide acétylsalicylique, anticoagulants, héparines, lithium, méthotrexate, pemetrexed, antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion, nicorandil, ciclosporine, tacrolimus, glucocorticoïdes, anti-agrégants plaquettaires, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, bêta-bloquants, déférasirox, hyperkaliémiant, pentoxifylline, ténofovir disoproxil.
-----------------	---





Autres produits	X.
-----------------	----

