



DELURSAN® ; Atteinte hépatique.

Indications : Cholestase, cirrhose biliaire primitive, cholangite sclérosante primitive, cholestase chronique de la mucoviscidose, cholestase intrahépatique familiale progressive de type III, cholestase gravidique, troubles hépatobiliaires associés à la mucoviscidose chez l'enfant âgé de 6 ans à 18 ans, lithiase/lithiase biliaire cholestérolique/biliaire LPAC.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	ACIDE URSODESOXYCHOLIQUE®.
Excipient notoire	Un cp contient 2mg de glucose anhydre, amidon de maïs, laurylsulfate de sodium, povidone, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, dioxyde de titane, hypromellose, propylène glycol.
Contre-indications	Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients, cholécystite aigüe, angiocholite, obstruction complète des voies biliaires, vésicule scléro-atrophiques, échec d'hépto-porto-entérostomie ou absence de la restauration d'un flux biliaire chez l'enfant ayant une atrésie des voies biliaires. (S'il le dit c'est que c'est vrai xD)
Fertilité Grossesse Allaitement	X. Possible. Possible.
Posologie	Cholestase : 13 à 15mg/kg/jour. Augmenter la dose par paliers pour obtenir la dose optimale après 4 à 8 semaines de traitement, sans dépasser 20mg/kg/jour. Cirrhose biliaire primitive : 13 à 15mg/kg/jour. Cholangite sclérosante primitive : 15 à 20mg/kg/jour. Ne pas dépasser 20mg/kg/jour. Cholestase chronique de la mucoviscidose : 20 à 30mg/kg/jour. Cholestases génétiques : 20 à 30mg/kg/jour. Cholestase gravidique : 10 à 20mg/kg/jour en continu jusqu'à accouchement. Ne pas dépasser 1g/jour, répartie en 2 prises, matin et soir, au moment des repas. Pédiatrie : Enfant ayant la mucoviscidose (de 6 à 18 ans) : 20mg/kg/jour répartie en 2 à 3 prises. Augmentation à 30mg/kg/jour, si nécessaire. Lithiase biliaire cholestérolique : 5 à 10mg/kg/jour, en fonction du poids du patient. Possibilité en une prise (le soir), ou en 2 prises (1 matin et 1 soir). Voie orale, comprimé pelliculé.

EFFETS

Attendus	Circulation entérohépatique des acides biliaires endogènes : augment° de sécrétion biliaire, inhibi° de réabsorption active par l'intestin et diminut° de concentration sanguine.
Indésirables	Fréquent : Selles pâteuses, diarrhée. Fréquence indéterminée : Ictère. Très Rare : Douleur de l'hypochondre droit lors du traitement d'une cirrhose biliaire primitive, calculs biliaires calcifiés, décompensation de cirrhose hépatique partiellement régressive à l'arrêt du traitement, urticaire.
Surdosage	Si augmentation de la dose prescrite, l'absorption diminue mais excrétion fécale augmente.
Conduite 🚗	X.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Cholestyramine, ciclosporine.
Autres produits	X.

