



AUGMENTIN® ; antibiotique (pdr sol buv, pdr sol inj ou cp)

Indications : infection chirurgicale, infection de la peau et des tissus mous, infection digestive et/ou biliaire, infection ostéoarticulaires, otites moyennes aiguës, sinusites, angines

Liste : I

Taux de remboursement + prix : 65% ; entre 2,95 € et 7,08 €

Titulaire AMM :

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	Amoxicilline, Acide clavulanique
Excipient notoire	Crospovidone pour cp
Contre-indications	Allergie aux pénicillines ou aux céphalosporines ATCD jaunisse ou hépatite lors prise d'un médicament contenant les deux molécules actives Phénylcétonurie (pdr pr susp buvable : présence d'aspartam)
Fertilité	/
Grossesse	/
Allaitement	Possible mais observance des symptômes (voir Clamoxyl®)
Posologie	Adulte et enfant +40kg : 1 à 3g/j répartis en plusieurs fois Nourrisson et enfant -40kg : 80mg/kg/j, répartis en 3 prises ⚠ Ne pas dépasser 3g/j

EFFETS

Attendus	
Indésirables	Diarrhée, nausées, vomissements, candidose, étourdissements, vertiges, démangeaisons
Surdosage	Aucune donnée
Conduite 🚗	Dans de rares cas : réaction allergique, vertiges, convulsions

INTÉRACTIONS

Médicamenteuse	Anticoagulant oraux Médicament contenant du méthotrexate, de l'allopurinol ou du probénécide
Autres produits	

