



BI-PROFENID® ; Antalgique et anti-inflammatoire.

Indications : Action antalgique et anti-inflammatoire.

Traitement au long cours de : rhumatismes inflammatoires chroniques (polyarthrite rhumatoïde,..), arthrose douloureuse invalidante.

Traitement de courte durée des poussées aiguës : rhumatismes tels que périarthrite, tendinites, arthroses, lombalgies.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	X / KETOPROFENE
Excipient notoire	Lactose et amidon de blé
Contre-indications	Hypersensibilité au kétoprofène ou à l'un des excipients. Au-delà de 24 semaines d'aménorrhée (5mois de grossesse révolu) Réaction d'hypersensibilité comme asthme, rhinite, urticaire, AINS, ulcère, insuffisance hépatique/rénale/cardiaque sévère.
Fertilité Grossesse Allaitement	Déconseillé. Déconseillé. Déconseillé.
Posologie	Composé de 2 couches une blanche (libération immédiate) et une couche jaune (libération prolongée) contenant chacune 50mg de kétoprofène. La dose maximale par jour est de 200mg par jour. Le rapport bénéfices/risques doit être attentivement évalué. Pour TTT au long court : 1 à 2 comprimés de 100mg par jour soit 200mg par jour. Pour TTT de courte durée : 2 comprimés de 100mg par jour soit 200mg par jour. Pour TTT prolongé, il est préférable de contrôler NFP, les fonctions hépatiques et rénale. A avaler avec un grand verre d'eau et si possible lors d'un repas ou avec une collation. Voie orale, comprimé sécable.

EFFETS

Attendus	Diminution de la douleur et de l'inflammation.
Indésirables	Fréquent : dyspepsie, nausée, vomissement, douleurs abdominales, douleurs gastriques. Peu fréquent : diarrhée, constipation, flatulence, gastrite, éruption, rash, prurit, céphalées, étourdissements, somnolence, œdème, fatigue. Fréquence indéterminée : Maladie de Crohn, hémorragie gastro-intestinale et perforation, œdème de Quincke, urticaire, vertiges, troubles de l'humeur, insuffisance rénale aiguë, thrombocytopénie, leucopénie, insuffisance cardiaque, HTA, hyperkaliémie. Rare : Ulcère peptique, colite, crise d'asthme, flou visuel, acouphènes, anémie due à une hémorragie, augmentation du taux de transaminases, prise de poids.
Surdosage	A partir de 2,5g surdosage possible.
Conduite 🚗	Si symptôme comme vertige, trouble de la visio, déconseillé de conduire.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuse	Diurétique, médicaments pouvant survenir à l'hyperkaliémie, AINS, antagoniste de l'angiotensine, HBPM, association de médicaments, anticoagulant, héparine non fractionnée, lithium, métrotexate, pemetrexed (fonction rénale), acide acétylsalicylique, corticoïde, antiagrégant plaquettaire, bêtabloquant.
Autres produits	Potassium, sel.



