



## BISOPROLOL® ; Bêta-bloquant sélectif.

**Indications : Traitement de l'HTA, de l'angor et de l'insuffisance cardiaque.**

### LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	BISOPROLOL®.
Excipient notoire	Amidon de maïs pré-gélatinisé, lactose monohydraté, macrogol 4000, dioxyde de titane.
Contre-indications	Insuffisance cardiaque aiguë/décompensation, choc cardiogénique, blocs auriculo-ventriculaires des 2 <sup>ème</sup> et 3 <sup>ème</sup> degrés, maladie du sinus, bloc sino-auriculaire, bradycardie, hypotension, asthme/BPCO sévère, artériopathies occlusives périphériques/syndrome de Raynaud, phéochromocytome, acidose métabolique, hypersensibilité à la molécule active/aux excipients.
Fertilité Grossesse Allaitement	X. Déconseillé. Déconseillé.
Posologie	<b>Insuffisance cardiaque chronique stable :</b> Composé d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion (inhibiteur du récepteur de l'angiotensine si intolérance), d'un bêta-bloquant, diurétiques et de glucosides cardiaques. Traitement au long cours et doit pas être arrêté brutalement, risque de dégradation du patient. Pas dépasser 10mg 1fois/jour. <b>Période de titration :</b> - 1,25mg 1fois/jour pdt 1 semaine. Si bonne tolérance - 2,5mg 1fois/jour pdt 1 autre semaine. Si bonne tolérance - 3,75mg 1fois/jour pdt 1 semaine. Si bonne tolérance - 5mg 1fois/jour pdt 4 semaines. Si bonne tolérance - 7,5mg 1fois/jour pdt 4 semaines. Si bonne tolérance - 10mg 1fois/jour en traitement de fond. Une aggravation transitoire peut se produire pendant la période de titration et par la suite. Une surveillance des constantes (FC, TA) et signes cliniques est recommandée pdt cette période. <b>Modification du traitement :</b> Si dose maximale est mal tolérée, diminution progressive. En cas d'aggravation transitoire, la posologie doit être revue jusqu'à que le patient soit stable. <b>Atteinte hépatique ou rénale :</b> Aucunes infos chez patients atteint simultanément d'insuffisance cardiaque et hépatique/rénale. L'augmentation doit être faite avec encore plus de précautions. <b>Pédiatrie :</b> Pas d'expérience chez enfants/adolescents, traitement par BISOPROLOL pas recommandée.

### EFFETS

Attendus	Augmente l'activité rénine plasmatique de façon importante.
Indésirables	<b>Fréquent :</b> vertiges, céphalées, aggravation de l'insuffisance cardiaque, extrémités froides/engourdit, hypotension, nausées, vomissements, diarrhée, constipation, asthénie. <b>Peu fréquent :</b> Troubles du sommeil, troubles de conduction auriculo-ventriculaire, hypotension orthostatique, bronchospasme, faiblesse/crampe musculaire. <b>Rare :</b> cauchemars, syncope, sécheresse lacrymale, troubles d'audition, rhinite allergique, hépatite, réaction d'hypersensibilité, hypertriglycéridémie, élévation des enzymes hépatiques. <b>Très rare :</b> Conjonctivite, douleurs thoraciques, psoriasis, alopecie.
Surdosage	Si surdosage, doit être arrêté et un traitement symptomatique + soutien doit être instauré : <b>Bradycardie :</b> Atropine IV. Si réponse inadaptée, donner avec précaution de l'isoprénaline ou médicament avec des propriétés chronotropes positives. <b>Hypotension :</b> Solutés IV + vasopresseurs (le glucagon en IV peut être utile). <b>Bloc auriculo-ventriculaire :</b> Surveillance ++, isoprénaline IV ou pose de stimulateur cardiaque. <b>Aggravation aiguë de l'IC :</b> Diurétiques, agents inotropes ou vasodilatateurs en IV. <b>Bronchospasme :</b> Broncho-dilatateur (ex : isoprénaline, aminophylline). <b>Hypoglycémie :</b> Glucose en IV.
Conduite 🚗	Réactions différentes suivant les patients, évaluer lors de la mise en place du traitement.

### INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Antagonistes calciques, anti-arythmiques de classe I, anti-hypertenseurs, antagonistes calciques dihydropyridine, anti-arythmiques de classe III, bêta-bloquants d'usage local, médicaments parasympathomimétiques, insuline, antidiabétiques oraux, anesthésiques, digitaliques, AINS, rifampicine, médicaments sympathomimétiques des récepteurs β- et α-adrénérgiques, méfloquine, inhibiteurs de monoamine-oxydase (sauf IMAO-B), dérivés de l'ergotamine.
Autres produits	X.

