



CARBOCISTEINE® ; Mucomodificateur.

Indications : Affection respiratoire récente avec difficulté d'expectoration (sécrétions bronchiques).

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	/ CARBOCISTEINE
Excipients notoires	Sodium (33,3mg/cuillère-mesure de 5ml), parahydroxybenzoate de méthyle (E218) (7,5mg/cuillère-mesure de 5ml).
Contre-indications	Hypersensibilité à la molécule active ou à l'un des excipients.
Fertilité Grossesse Allaitement	X. Déconseillé. Possible d'allaiter.
Posologie	RÉSERVÉ À L'ADULTE ET L'ENFANT DE + DE 15 ANS. Une cuillère-mesure de 5ml contient 250mg de carbocistéine. Dose : 3 cuillères-mesure, 3fois/jour en dehors des repas. Le traitement doit être de courte durée (maximum 5 jours). Voie orale, solution buvable.

EFFETS

Attendus	Modification de l'aspect du mucus favorisant l'expectoration.
Indésirables	Possibilité d'intolérance digestive (gastralgies, nausées, diarrhées). Il est alors conseillé de réduire la dose.
Surdosage	X.
Conduite	X.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Pas d'interactions connues.
Autres produits	X.

