



CHLORHEXIDINE® ; Antiseptique bactéricide à large spectre.

Indications : Antiseptie des plaies superficielles et de faible étendue. Ils ne sont pas stérilisants, ils réduisent temporairement sur la peau le nombre de micro-organismes.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	/ CHLORHEXIDINE.
Excipients notoire	Digluconate de chlorhexidine, eau purifiée.
Contre-indications	Hypersensibilité à la molécule active ou à l'un des excipients, ne pas appliquer dans les yeux, les oreilles ou sur les muqueuses.
Fertilité Grossesse Allaitement	X. X. X.
Posologie	Solution prête à l'emploi, à usage unique. Ce produit peut être appliqué directement sur les plaies. Ne pas rincer. Ne pas avaler. Usage externe. Solution pour application cutanée.

EFFETS

Attendus	Antiseptie.
Indésirables	Risque d'effets systémiques. Possibilité d'eczéma allergique de contact. Idiosyncrasie en particulier, choc anaphylactique (rare). Brûlures chimiques chez les nouveau-nés (fréquence inconnue).
Surdosage	Si ingestion orale massive, faire un lavage gastrique. La toxicité est faible (absorption digestive presque négligeable).
Conduite	X.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Générale : L'emploi simultané/successif d'antiseptiques est à éviter sauf avec les autres composés cationiques. Particulière : attention aux incompatibilités physicochimiques, dérivés anioniques.
Autres produits	X.

