



## CHLORHYDRATE DE THIAMINE® ; Apport de vitamine B1.

**Indications : Traitement de la carence en vitamine B1.  
Encéphalopathie de Gayet Wernicke, en relais d'un traitement parentéral.**

### LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	CHLORHYDRATE DE THIAMINE.
Excipients notoire	Amidon de blé (gluten).
Contre-indications	Hypersensibilité à la molécule active ou aux excipients.
Fertilité Grossesse Allaitement	Déconseillé. Déconseillé. Déconseillé.
Posologie	RÉSERVÉ à l'adulte ! 1 à 2 comprimés par jour. Avaler, sans croquer, les comprimés avec un peu d'eau. Voie orale, comprimé enrobé.

### EFFETS

Attendus	La thiamine est absorbée au niveau de l'intestin grêle et diffuse dans tous les tissus, permet de rééquilibrer la vitamine B1.
Indésirables	Des cas isolés de réactions allergiques de type choc anaphylactique, prurit, urticaire, démangeaisons, angioedèmes, douleurs abdominales, détresse respiratoire, tachycardie, palpitations, collapsus, nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales ont été rapportés.
Surdosage	Pas de cas de surdosage rapporté, à très fortes doses, la thiamine peut entraîner des maux de tête, nausées, irritabilité et hypotension.
Conduite	X.

### INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Pas d'interactions connues.
Autres produits	X.

