



CHOLECALCIFEROL® ; Vitamine D3.

Indications : Traitement et/ou prophylaxie de la carence en vitamine D.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	/ CHOLECALCIFEROL.
Excipients notaires	Huile essentielle d'orange douce, glycérides polyglycolysés insaturés, huile d'olive raffinée pour préparations injectables.
Contre-indications	Hypersensibilité à la molécule active ou à l'un des excipients, hypercalcémie, hypercalciurie, lithiase calcique, hypervitaminose D, pathologie et/ou conditions entraînant une hypercalcémie et/ou une hypercalciurie.
Fertilité Grossesse Allaitement	X. Possible. Possible.
Posologie	<p>Adulte et sujet âgé : 1 ampoule (50.000UI)/1 à 2 semaines selon la carence, jusqu'à normalisation de la calcémie et de la phosphorémie. Puis traitement prophylactique sans dépasser 600.000UI/an : 1 ampoule/1-2 mois. ⚠ Surveiller la calciurie pour éviter un surdosage ⚠</p> <p>Femme enceinte : <i>Prophylaxie,</i> 2 ampoules, en une seule prise, au 6^{ème} ou 7^{ème} mois de la grossesse.</p> <p>Population pédiatrique : <i>Prophylaxie,</i> Mise en œuvre impérative chez TOUS les nourrissons et les jeunes enfants, dans les conditions actuelles de vie (circulaires ministérielles du 21 février 1963 et 6 janvier 1971) et recommandé de l'assurer tout au long de la croissance en raison de : - l'exposition insuffisante au soleil, - la faible teneur des aliments en vitamine D.</p> <p>De nouveau-né à nourrisson jusqu'à 18 mois : préférable d'administrer des doses quotidiennes en gouttes.</p> <p>De 18 mois à la fin de l'adolescence : 1 ampoule/1 à 2 mois en hivers. Si risques particuliers (forte pigmentation cutanée, malabsorption digestive, insuffisance rénale, traitement anti-épileptique, obésité..) possibilité de poursuivre le complément toute l'année ou d'augmenter les doses. <i>Peut être pris pur ou mélangé dans un aliment liquide/semi-liquide.</i> Voie orale, Solution buvable en ampoule.</p>

EFFETS

Attendus	Augmentation de la vitamine D chez l'individu, rétablissement taux normal.
Indésirables	Fréquence indéterminée : prurit, éruption cutanée, érythème, œdème.
Surdosage	<p>Signes cliniques : Céphalées, asthénie, anorexie, amaigrissement, arrêt de croissance, nausées, vomissements, polyurie, polydipsie, déshydratation, HTA, lithiase calcique, calcifications tissulaires en particulier rénales et vasculaires, insuffisance rénale.</p> <p>Signes biologiques : Hypercalcémie, hypercalciurie, hyperphosphatémie, basse concentration d'hormone parathyroïdienne et haute en 25-hydroxyvitamine D.</p> <p>Conduite à tenir : Arrêt vitamine D + réduction d'apports + augmentation de la diurèse avec boissons abondantes.</p>
Conduite	Pas d'étude.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Anticonvulsivants inducteurs enzymatiques, Rifampicine, Orlistat.
Autres produits	X.

