



CICLOPIROX® ; Antifongique à large spectre.

Indications : Traitement de la dermatite séborrhéique du cuir chevelu.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	/ CICLOPIROX.
Excipients notoires	L'acide benzoïque, le benzoate de sodium, chlorure de sodium, eau purifiée.
Contre-indications	Hypersensibilité à la molécule active ou à l'un des excipients.
Fertilité Grossesse Allaitement	X. Déconseillé. Ne pas appliquer si allaitement.
Posologie	Traitement initial, MYCOSTER 10 mg/g : Appliquer sur le cuir chevelu 1 à 2 fois/semaine, selon la sévérité de l'affection, pendant 4 semaines. Traitement prophylactique : Peut-être continué pendant 12 semaines supplémentaires. L'utilisation continue est limitée à 16 semaines maximum. Protocole : Mouiller les cheveux, Appliquer le contenu (1 bouchon environ 5ml), si cheveux dépassent les épaules, utiliser jusqu'à (2 bouchons environ 10ml). Faire mousser en massant le cuir chevelu soigneusement. Laisser agir pendant 3min puis rincer abondamment à l'eau. Voie cutanée, shampooing.

EFFETS

Attendus	Antifongique avec action fongicide.
Indésirables	Rare : Dermatite de contact allergique. Peu fréquent : réactions cutanées (irritation, eczéma, brûlures/démangeaisons, chute légère des cheveux/légère décoloration, cheveux ternes/emmêlés/secs.
Surdosage	Pas de données ; si ingestion accidentelle, un traitement approprié doit être pris.
Conduite	X.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Pas d'interactions connues.
Autres produits	X.

