



DESOGESTREL® ; Contraceptif hormonal progestatif à usage systémique.

Indications : Contraception orale.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	/ DESOGESTREL.
Excipients notaires	Chaque cp contient 55mg de lactose monohydraté, de l'amidon de maïs, povidone.. <i>Pelliculage</i> : Hypromellose, macrogol 400, dioxyde de titane, talc.
Contre-indications	Si l'une de ces situations apparaît lors de la prise, l'arrêter immédiatement : hypersensibilité à la molécule active ou à l'un des excipients, accidents thromboemboliques veineux évolutifs, présence/antécédent d'affection hépatique sévère, tumeurs malignes sensibles aux stéroïdes sexuels, hémorragies génitales inexplicables, le MILLEPERTUIS.
Fertilité Grossesse Allaitement	Indiqué pour prévenir la grossesse. L'absence de grossesse doit être vérifiée avant le début du traitement. Peut être pris pdt l'allaitement. Néanmoins, le bébé devra être suivi attentivement.
Posologie	<p>La sécurité et l'efficacité n'ont pas été étudiées chez les adolescentes de moins de 18 ans.</p> <p>Comment prendre le traitement Prendre dans l'ordre indiqué sur la plaquette, chaque jour pendant 28j consécutifs sans tenir compte de possibles saignements, à la même heure avec de l'eau si besoin, avec un intervalle entre 2 cps de 24h. Une nouvelle plaquette doit être débutée le lendemain où la plaquette précédente est terminée.</p> <p>Comment débiter le traitement Pas de prise de contraception hormonale dans le mois précédent le début de celui-ci. Le 1^{er} comprimé doit être pris le premier jour du cycle naturel de la femme. Possible de commencer entre le 2^{ème} et le 5^{ème} jour mais un préservatif est à utiliser en complément pdt les 7 premiers jours.</p> <p>Relais d'un contraceptif hormonal combiné La femme doit commencer CERAZETTE le jour suivant la prise du dernier comprimé actif (c'est-à-dire le dernier comprimé contenant la substance active) de son précédent COC/le jour du retrait de l'anneau vaginal/du patch transdermique. Dans ces cas, il n'est pas nécessaire d'utiliser de contraception mécanique supplémentaire.</p> <p>Relais d'une méthode uniquement progestative Peut commencer n'importe quel jour. En relais d'un implant ou d'un SIU : le jour de leur retrait. En relais d'un progestatif injectable, le jour prévu pour l'injection suivante. Pas nécessaire d'utiliser une contraception mécanique supplémentaire.</p> <p>Après un avortement du premier trimestre Recommandé de débiter la prise des comprimés immédiatement et d'utiliser de contraception mécanique supplémentaire.</p> <p>Après une naissance ou après un avortement du second trimestre 21 à 28 jours après la naissance/l'avortement du second trimestre. Si commencé plus tard, contraception mécanique supplémentaire pdt les 7 premiers jours ; l'éventualité d'une grossesse doit être exclue avant de débiter le traitement.</p> <p>Conseils en cas d'oubli d'un comprimé ⚠ La protection contraceptive peut être réduite si + de 36h s'écoulent entre 2cps. ⚠ Si l'oubli est dans les 12h, prendre immédiatement le cp oublié et prendre le suivant à l'heure habituelle. Si l'oubli est supérieur à 12h, prendre immédiatement le cp oublié et prendre le prochain à l'heure habituelle, même si double prise + contraception mécanique supplémentaire pendant les 7 jours suivants. Si l'oubli pendant la première semaine après l'initiation, dans les 7 premiers jours suivant, risque de grossesse.</p> <p>Conseils en cas de troubles gastro-intestinaux Si vomissements ou diarrhée sévère dans les 3-4h suivant la prise d'un comprimé, l'absorption n'est pas complète. Si la prise d'un nouveau cp s'impose, prendre le(s) comprimé(s) supplémentaire(s) dans une autre plaquette.</p> <p>Voie orale, comprimé pelliculé.</p>

EFFETS

Attendus	Augmentation de la viscosité de la glaire cervicale -> contraceptive.
Indésirables	<p>Fréquent : Modification de l'humeur, diminution de la libido, humeur dépressive, céphalées, nausées, acné, saignements irréguliers, aménorrhée, prise de poids.</p> <p>Peu fréquent : Infection vaginale, intolérance aux lentilles de contact, vomissement, dysménorrhée, kyste ovarien, asthénie.</p> <p>Fréquence indéterminée : Hypersensibilité y compris angioedème et anaphylaxie.</p> <p>Rare : Erythème noueux, rash, urticaire.</p>
Surdosage	Sans gravités, symptomatiques
Conduite	X.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Voir avec le médecin.
Autres produits	X.

