



DIOSMECTITE® ; Absorbant intestinal.

Indications : Traitement de la diarrhée aiguë chez l'adulte et l'enfant de plus de 2 ans, de la diarrhée chronique et des douleurs d'affections intestinales chez l'adulte.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	/ DIOSMECTITE.
Excipients notoires	Glucose monohydraté, saccharine sodique, arôme.
Contre-indications	Hypersensibilité à la molécule active ou à l'un des excipients.
Fertilité Grossesse Allaitement	Pas d'étude. N'est pas recommandé. N'est pas recommandé.
Posologie	Traitement de la diarrhée aiguë Chez l'enfant à partir de 2 ans : 4 sachets/jour pendant 3 jours puis 2 sachets/jour pendant 4 jours. Chez l'adulte : 3 sachets/jour pendant 7 jours. Possible de doubler la posologie en début de ttt. Mode d'administration : - Chez l'enfant : le sachet peut être dilué dans un biberon de 50ml d'eau à répartir au cours de la journée, ou bien mélangé à un aliment semi-liquide : bouillie, compote, purée, "petit-pot" ... - Chez l'adulte : le contenu du sachet peut être dilué dans un demi-verre d'eau. <i>Voie orale, suspension buvable en sachet.</i>

EFFETS

Attendus	Absorption des gaz intestinaux chez l'adulte, restaure la perméabilité de la muqueuse.
Indésirables	Rare : urticaire. Peu fréquent : éruption, vomissement. Fréquence indéterminée : angioedème, prurit, hypersensibilité. Fréquent : constipation.
Surdosage	Constipation sévère ou bézoard.
Conduite	X.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Ayant des propriétés absorbantes, recommandé d'administrer d'autres médicaments ou produit à plus de 2 heures de celui-ci.
Autres produits	X.

