Diprivan® : hypnotique – agent anesthésique non barbiturique.

Indication : utilisé pour l'anesthésie (induction et entretien) et la sédation

LE MÉDICAMENT	
Molécule active / DCI	Propofol®.
Excipient notoire	Huile de soja raffinée, sodium.
Contre-indications	Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients Absence de matériel de réanimation
Fertilité Grossesse Allaitement	/ Mesure de précaution, à éviter (risque tératogène) – pas d'AMM Non recommandé
Posologie	**Induction :** < 1 mois : 10 mg / kg < 55 ans : 1,5 à 2,5 mg / kg > 75 ans : 1,5 mg / kg **Entretien :** Adulte et sujet âgé : 0,1 à 0,2 mg/kg/min (6 à 12 mg/kg/h) Possibilité de bolus de 25 à 50 mg Enfant : 9 à 15 mg/kg/h en moyenne **Sédation en SI :** > 16 ans : 1 mg/kg/h à 6 mg/kg/h (éviter > à 4 mg/kg/h)

EFFETS	
Attendus	Diminuer la douleur.
Indésirables	**Très fréquent :** Nausées. **Fréquent :** **Apnée,** détresse respiratoire, **hypotension, bradycardie**, céphalées, apnée, nausées et vomissements, urines vertes. **Peu fréquent :** Thrombopénie. **Si administration > 48h** : trble du rythme, insuffisance rénale, acidose métabolique, rhabdomyolyse, hyperlipidémie
Surdosage	Dépression respiratoire et cardio-vasculaire.
Conduite 🚘	Durant la sédation ce n'est pas conseillé. Après non plus. LOL.

INTÉRACTIONS	
Médicamenteuses	Diminution des doses avec midazolam : peut augmenter la sédation et la dépression respiratoire Diminution des doses avec administration concomitante de valproate

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI	
Préparation	Possible dilution que dans du G5% Utilisation principalement pure : utilisation obligatoire en PSE ou pompe
À savoir	Contient des lipides → attention si administration de lipides en simultanée, prendre garde aux patients en dyslipidémiques Surveillance des lipides La contenant utilisé pour administrés le propofol **ne doit pas être conservé > 12h** (émulsion lipidique) Délai d'action : **30 secondes** Durée d'action : **5 à 20 minutes**

©Eide.fr