



ECONAZOLE® ; Antifongique local.

Indications : Candidoses cutanées (habituellement dues à *Candida albicans*), traitement des mycoses des plis macérés (intertrigo génital, sous-mammaire, inter-digital, etc), dermatophyties (intertrigo macéré génital et crural/des orteils).

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	/ ECONAZOLE.						
Excipients notoires	Talc, silice colloïdale anhydre (AEROSIL 300), oxyde de zinc léger.						
Contre-indications	Hypersensibilité à la molécule active, aux dérivés imidazolés ou l'un des excipients.						
Fertilité Grossesse Allaitement	X. Ne doit pas être utilisé au cours du premier trimestre, sauf si essentiel pour la mère. Précaution et ne pas appliquer sur les seins en période d'allaitement.						
Posologie	Application biquotidienne régulière jusqu'à disparition complète des lésions.						
	<table border="1"><thead><tr><th>Indication</th><th>Durée du traitement</th></tr></thead><tbody><tr><td>Candidoses : Mycoses des plis macérés (intertrigo génital, sous-mammaire, inter-digital..)</td><td>1 à 2 semaines</td></tr><tr><td>Dermatophyties : Intertrigo macéré génital et crural Intertrigo des orteils</td><td>2 à 3 semaines 3 semaines</td></tr></tbody></table>	Indication	Durée du traitement	Candidoses : Mycoses des plis macérés (intertrigo génital, sous-mammaire, inter-digital..)	1 à 2 semaines	Dermatophyties : Intertrigo macéré génital et crural Intertrigo des orteils	2 à 3 semaines 3 semaines
	Indication	Durée du traitement					
Candidoses : Mycoses des plis macérés (intertrigo génital, sous-mammaire, inter-digital..)	1 à 2 semaines						
Dermatophyties : Intertrigo macéré génital et crural Intertrigo des orteils	2 à 3 semaines 3 semaines						
Poudrer les lésions à traiter en balayant toute la zone atteinte. Voie cutanée, poudre pour application locale.							

EFFETS

Attendus	Action antifongique et antibactérienne.
Indésirables	Peu fréquent : érythème, gêne, gonflement. Fréquence indéterminée : hypersensibilité, angioœdème, dermite de contact, rash, urticaire, vésicule cutanée, exfoliation de la peau. Fréquent : prurit, sensation de brûlure, douleur.
Surdosage	Aucun cas de surdosage n'a été rapporté à ce jour. Si inhalation accidentelle risque de blocage des voies aériennes lié au talc, surtout chez les nourrissons et les jeunes enfants. L'arrêt respiratoire doit être traité en USI avec oxygénothérapie. Si respiration compromise : intubation trachéale, retrait de matière inhalée, et ventilation artificielle. Si ingestion accidentelle, le traitement sera symptomatique.
Conduite	X.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Anti-vitamines K (Acénocoumarol, Fluindione, Warfarine).
Autres produits	X.

