



HYDROCORTISONE® ; Corticoïdes d'activité modérée.

Indications : traitement des dermatoses inflammatoires, allergiques et prurigineuses non causées par des microorganismes, eczéma de contact, dermatite atopique/de stase, psoriasis, dermatoses aiguës suintantes.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	/ HYDROCORTISONE
Excipients notoire	Alcool céstostéarylique et parahydroxybenzoates (de propyle E216 et de butyle), vaseline, eau purifiée, paraffine liquide légère.
Contre-indications	Hypersensibilité à la molécule active ou à l'un des excipients, infection due à des bactéries/virus/champignons/levures/parasites, lésions ulcérées, dermatite périorale.
Fertilité Grossesse Allaitement	X. Uniquement si le bénéfice l'emporte sur le risque potentiel et en limitant la surface. Ne pas appliquer sur les seins en période d'allaitement.
Posologie	1 à 2 applications/jour en couche mince et uniforme sur la zone de la peau atteinte jusqu'à ce qu'elle soit entièrement absorbée. Une augmentation du nombre d'applications risquerait d'aggraver les EI sans améliorer les effets thérapeutiques. ⚠ Le traitement des grandes surfaces nécessite une surveillance du nombre de tubes utilisés. ⚠ Se laver les mains après chaque application, sauf si LOCOID est utilisé pour traiter les mains. Certaines dermatoses (psoriasis, dermatite atopique) arrêt progressif (diminution des fréquences d'applications et/ou par l'utilisation d'un corticoïde - fort ou – dosé). Population pédiatrique La sécurité et l'efficacité de ce médicament chez les enfants âgés de moins de 3 mois n'ont pas été établies. Chez les enfants/nourrissons, éviter l'utilisation de grandes quantités, sous pansement occlusif ou prolongés. Chez les nourrissons, le traitement ne doit pas dépasser 7j en général. <small>Voie cutanée, crème.</small>

EFFETS

Attendus	Anti-inflammatoires, antiprurigineuses et vasoconstrictrices.
Indésirables	Très rare : Suppression cortico-surrénalienne. Rare : Atrophie cutanée, dermatite, purpura, acné, vergetures, dépigmentation. Fréquence indéterminée : Infection cutanée, hypersensibilité, vision flou, douleur au site d'application, prurit, érythème, escarres, aggravation de la rosacée.
Surdosage	Il n'existe pas de données sur le surdosage, si systémique, traiter les symptômes.
Conduite	X.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Diminution de la tolérance au glucose avec antidiabétiques. Prévenir le patient et renforcer l'autosurveillance glycémique et urinaire surtout en début de traitement.
Autres produits	X.

