



IBUPROFENE® ; Anti-Inflammatoire Non Stéroïdien.

Indications : Traitement de courte durée de la fièvre et/ou des douleurs telles que : maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	IBUPROFENE.
Excipients notoires	Saccharose.
Contre-indications	Hypersensibilité à molécule active ou à l'un des excipients, Grossesse, à partir du début du 6ème mois, antécédents d'asthme déclenchés par la prise d'ibuprofène ou de substances d'activité proche telles que: autres AINS, acide acétylsalicylique, antécédents d'hémorragie ou de perforation digestive au cours d'un précédent traitement par AINS, hémorragie gastro-intestinale, hémorragies, ulcère peptique évolutif, insuffisance hépatique, rénale ou cardiaque sévère, lupus érythémateux disséminé, enfant de - de 6 ans car risque de fausse route.
Fertilité Grossesse Allaitement	Déconseillé. Déconseillé. Déconseillé.
Posologie	Adapté à l'adulte et l'enfant de plus de 20kg (environ 6ans). Affections douloureuses et/ou fébriles : Chez l'enfant, 20 à 30 mg/kg/jour en 3 prises/jour. Enfant de 20 à 30kg (environ 6 à 11ans) : 1cp (200mg). Renouvelable SB chaque 6h. Ne pas dépasser 3cps/jour. Adulte et enfant de + de 30 kg (environ 11-12ans) : 1 à 2 cps, renouvelable SB chaque 6h. Ne pas dépasser 6 cps/jour. La prise systématique permet d'éviter les oscillations de douleur / fièvre. Avaler le comprimé, sans le croquer, avec un grand verre d'eau, de préférence au cours des repas. Voie orale, comprimé enrobé.

EFFETS

Attendus	Antalgique, anti-pyrétique, anti-inflammatoire, anti-agrégant plaquettaires.
Indésirables	Cas possible, fréquence inconnu : nausées, vomissements, diarrhées, flatulences, constipation, dyspepsie, stomatite ulcérateuse, douleur abdominale, douleur abdominale haute, distension abdominale, melæna, hématurie, colite, exacerbation d'une rectocolite ou d'une maladie de Crohn, gastralgie, trouble du transit, éruptions, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction anaphylactique, vertiges, céphalées, oligurie, acouphène, dyspnée, leucopénie..
Surdosage	Signes : Vertiges, douleur abdominale, nausées, vomissements, anomalies du bilan hépatique, hyperkaliémie, acidose métabolique, sensation vertigineuse, somnolence, céphalée, perte de conscience, convulsions, insuffisance rénale, dyspnée, dépression respiratoire, hypotension. En cas d'intoxication grave, une acidose métabolique peut survenir. Conduite à tenir : Transfert immédiat en milieu hospitalier, évacuation rapide du produit ingéré par lavage gastrique, charbon activé pour diminuer l'absorption de l'ibuprofène. Traitement symptomatique.
Conduite	Apparition possible de vertiges et de troubles de la vue, avis médecin suivant dose.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Les sels de potassium, les diurétiques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes de l'angiotensine II, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les héparines (de bas poids moléculaires ou non fractionnées), les immunosuppresseurs comme la ciclosporine ou le tacrolimus, le triméthoprime, Acide acétylsalicylique, Anticoagulants oraux, lithium, Méthotrexate et kétoprofène, Pemetrexed, Ciclosporine, tacrolimus, Tenofovir Disoproxil, Antiagrégants plaquettaires, Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, Bêta-bloquants (sauf esmolol), Dférasirox, Glucocorticoïdes (sauf hydrocortisone), Pentoxifylline.
Autres produits	X.

