



INEXIUM® ; Protecteur gastrique.

Indications : indiqué pour les reflux gastro-oesophagien, pour les patients ayant des traitements d'AINS, prévention d'ulcère gastro-duodénaux.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	22,3mg de d'ésoméprazole magnésique trihydraté / INEXIUM
Excipient notoire	Chaque comprimé contient 28mg de saccharose.
Contre-indications	Hypersensibilité à la substance active, aux dérivés benzimidazolés, ne doit pas être utilisé de façon concomitante avec le nelfinavir.
Fertilité Grossesse Allaitement	Pas d'impact. Déconseillé. Déconseillé.
Posologie	20mg une fois par jour pour les patients étant sous AINS pour une durée de 4 à 8 semaines en prévention d'ulcères gastro-duodénaux. Le comprimé doit être avalé en entier avec une boisson, ne doit pas être mâché ni croqué. Voie orale, comprimé.

EFFETS

Attendus	Protection gastrique.
Indésirables	Très fréquent : X Fréquent : céphalées, douleurs abdominales, constipation, diarrhée, flatulence, nausées/vomissements, polypes des glandes fundiques (bénins). Peu fréquent : œdème périphérique, insomnie, étourdissements, paresthésies, somnolence, vertiges, sècheresse buccale, augmentation des enzymes hépatiques, dermatite, prurit, rash, urticaire, fracture de la hanche/ du poignet/ou des vertèbres. Fréquence indéterminée : Rare : leucopénie, thrombocytopénie, hypersensibilité (fièvre), angio-œdème, réaction/choc anaphylactique, hyponatrémie, agitation, confusion, dépression, troubles du goût, bronchospasme, stomatite, candidose gastrointestinale, hépatite avec ou sans ictère, alopecie, photosensibilisation, arthralgies, myalgies, malaise, augmentation de la sudation.
Surdosage	Très limité si volontaire, il faut atteindre minimum 280mg et non fatal.
Conduite 🚗	Si étourdissements, vision trouble, ne pas prendre le volant, sinon pas de contre-indication si absence d'effets indésirables.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuse	Inhibiteurs de protéase, methotrexate, tacrolimus, diazepam, phénytoïne, voriconazole, cilostazol, cisapride, warfarine, clopidogrel, amoxicilline et quinidine, naproxène ou rofécoxib.
Autres produits	X

