



LEVONORGESTREL® ; Contraceptif d'urgence.

Indications : Contraception d'urgence à prendre dans les 72h après le rapport sexuel non protégé ou en cas d'échec d'une méthode contraceptive.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	/ LEVONORGESTREL.
Excipients notoire	Cellulose microcristalline, poloxamer 188, Croscarmellose sodique, Stéarate de magnésium, lactose monohydraté.
Contre-indications	Hypersensibilité à la molécule active ou à l'un des excipients.
Fertilité Grossesse Allaitement	X. Ne pas prendre pendant la grossesse, peu importe le stade. Allaiter avant la prise si nécessaire et éviter l'allaitement juste après la prise.
Posologie	Prise : Le plus tôt possible, dans les 12h après le rapport sexuel non protégé ou dans les 72h au plus tard. Peut être pris à n'importe quelle période du cycle menstruel sauf en cas de retard des règles. Si vomissements survenant dans les 3h suivant la prise du comprimé, en reprendre un autre immédiatement. Si utilisation au cours des 4 dernières semaines mais qui ont besoin d'une contraception d'urgence, utiliser une méthode contraceptive non hormonale (DIU-Cu) ou de prendre une double dose (2cps pris ensemble) pour celles qui ne peuvent ou ne veulent pas utiliser le DIU-Cu. Après la prise, utiliser un contraceptif local (préservatif, diaphragme, cape cervicale) jusqu'au règles suivantes. Population pédiatrique : N'est pas recommandé chez les femmes de moins de 16 ans car les données sont très limitées. Comprimé blanc, rond, avec une inscription "L" sur une face et "1" sur l'autre. <i>Voie orale, comprimé.</i>

EFFETS

Attendus	Inhibition de l'ovulation/de la fécondation.
Indésirables	Très rare : rash, urticaire, prurit, œdème de la face. Très fréquents : métrorragie, céphalées, nausées, douleurs abdo basses, asthénie. Fréquents : tension mammaire, retard de règles de plus de 7j, saignement irrégulier/spotting, vertiges, diarrhées, vomissements.
Surdosage	Possible nausées ou hémorragies de privation. Pas d'antidote spécifique, traitement symptomatique.
Conduite	X.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Barbituriques (y compris primidone), Carbamazépine, Griséofulvine, Inducteurs d'enzymes hépatiques (principalement les CYP3A4), Médicaments à base de plantes contenant <i>Hypericum perforatum</i> (Millepertuis), Médicaments contenant du lévonorgestrel, Phénytoïne, Rifabutine, Rifampicine, Ritonavir.
Autres produits	X.

