



## MACROGOL® ; Laxatif osmotique.

**Indications** : Traitement de la constipation / l'impaction fécale chez l'adulte.

### LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	/ MACROGOL.
Excipients notoire	Acésulfame potassique (E950), arôme citron (gomme végétale (E414), maltodextrine, huile essentielle de citron, huile essentielle de limette, citral et acide citrique (E330)).
Contre-indications	Hypersensibilité à la molécule active ou à l'un des excipients, maladies inflammatoires sévères de l'intestin (rectocolite hémorragique, maladie de Crohn..), mégacôlon toxique, risque/perforation digestive, iléus/syndrome occlusif, syndromes douloureux abdo.
Fertilité Grossesse Allaitement	X. Aucun effet. Aucun effet.
Posologie	<b>RESERVE À L'ADULTE</b> : 1 à 2 sachets/j de préférence en une seule prise, le matin. <b>Impaction fécale</b> : 8 sachets/j, répartie en 2 prises dans 500ml d'eau, matin et soir, pendant une durée allant de 1 à 3 jours. Arrêt dès l'obtention d'une évacuation satisfaisante des matières fécales. <b>Chaque sachet doit être mis en solution dans un verre d'eau. L'effet se manifeste dans les 24 à 48h.</b> <i>Voie orale, poudre pour solution buvable en sachet.</i>

### EFFETS

Attendus	Augmentation du volume des liquides intestinaux, stimule la motricité colique, ramollit les selles.
Indésirables	<b>Très rare</b> : réactions d'hypersensibilité (réactions anaphylactiques), dyspnée, réactions cutanées. <b>Fréquence indéterminée</b> : angioedème, urticaire, prurit, éruption, érythème, Perturbations électrolytiques (hyperkaliémie et hypokaliémie), céphalées, douleurs abdo, nausées, vomissements, ballonnements, diarrhées, œdème périphérique.
Surdosage	Possible diarrhées cédant à l'arrêt du traitement. <b>Si</b> vomissement possible nécessité de correction hydroélectrolytique.
Conduite	X.

### INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Antiépileptiques. Les traitements oraux habituels ne doivent pas être pris dans l'heure précédant l'ingestion du laxatif.
Autres produits	X.

