



## ACUPAN® ; Antalgique, antipyrétique, antispasmodiques.

**Indications : Traitement symptomatique des affections douloureuses aiguës, notamment des douleurs post-opératoires.**

### LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	NEFOPAM®.
Excipient notoire	EPPI, phosphate monosodique, phosphate disodique.
Contre-indications	Hypersensibilité à la molécule active ou à l'un des excipients, enfant de moins de 15 ans, convulsions ou antécédents de troubles convulsifs, risques de rétention urinaire, risque de glaucome par fermeture de l'angle.
Fertilité Grossesse Allaitement	X. Déconseillé. Déconseillé.
Posologie	<b>Voie IM</b> : 20mg/injection. Si nécessaire, peut être répétée toutes les 6h sans dépasser 120mg/24h. <b>Voie IV</b> : 20mg/injection. En perfusion lentement, en décubitus, sur plus de 15min pour éviter les EI. Si nécessaire, peut être répétée toutes les 4h, sans dépasser 120mg/24h. <b>Voie Per os</b> : 20mg/administration. Si nécessaire, peut être répétée toutes les 4h, sans dépasser 120mg/24h. Peut être administré directement dans la bouche ou sur un sucre.

### EFFETS

Attendus	Diminution de la douleur et de la température.
Indésirables	<b>Très fréquent</b> : Somnolences, nausées avec ou sans vomissement, hyperhydrose. <b>Fréquent</b> : Vertiges, tachycardie, palpitations, bouche sèche, rétention urinaire. <b>Fréquence indéterminée</b> : Etat confusionnel, coma. <b>Rare</b> : Irritabilité, hallucination, pharmacodépendance, malaise, hypersensibilité.
Surdosage	Effets indésirables -> Traitement symptomatique avec surveillance cardiaque et respiratoire.
Conduite 🚗	Si effets indésirables, ne pas conduire.

### INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Dérivés morphiniques, neuroleptiques, barbituriques, benzodiazépines, anxiolytiques autres que les benzodiazépines, hypnotiques, antidépresseurs sédatifs, antihistaminiques H1 sédatifs, antihypertenseurs centraux, baclofène et thalidomide.
Autres produits	Alcool.

