



NORADRENALINE® ; Vasoconstricteur instantané.

Indications : En perfusion IV :

Traitement d'urgence du collapsus, pour la restauration et le maintien de la PA.


En irrigation locale gastrique :

Traitement des hémorragies digestives, en complément des traitements habituels.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	NORADRENALINE®.
Excipient notoire	Tartrate de noradrénaline. Une ampoule de 4ml contient 8mg de tartrate de noradrénaline.
Contre-indications	Il n'y a pas de contre-indication lorsque les indications sont respectées.
Fertilité	X.
Grossesse	Pas contre-indiqué, tenir compte des propriétés pharmacologiques.
Allaitement	X.
Posologie	Les doses initiales recommandées sont : De 0,1 à 0,3 μ g/kg/min. La posologie est à adapter en fonction de l'état clinique du patient. Doit être impérativement en IV de préférence par voie veineuse centrale. Si extravasation risque de vasoconstriction locale intense avec une nécrose des tissus. Doit être obligatoirement diluée avant perfusion IV, généralement dans du G5% isotonique. Ne doit pas être mélangée avec d'autres médicaments. Hémorragie digestive : Lavage gastrique avec NaCl glacé + 8 à 16mg de noradrénaline.

EFFETS

Attendus	Action très puissante sur les récepteurs alpha ainsi que modérée sur les bêta 1. Provoque une vasoconstriction généralisée, à l'exception des coronaires qu'elle dilate de façon indirecte par augmentation de la consommation d'O ₂ . L'augmentation de la tension est instantanée. Elle est 1,5 fois plus intense que l'adrénaline.
Indésirables	Fréquent : Anxiété, céphalée, tremblements, dyspnée, douleur oropharyngée. Fréquence indéterminée : Douleur thoracique, tachycardie/bradycardie, cardiomyopathie provoquée par le stress, vomissements, hyperhidrose, pâleur, nécrose cutanée si extravasation.
Surdosage	Observation possible en cas de surdosage : vasoconstriction cutanée, escarres, collapsus, HTA. En cas d'EI liés à des posologies excessives, diminuer la posologie le plus possible.
Conduite 	X.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Anesthésiques volatils halogénés, antidépresseurs imipraminiques, médicaments mixtes adrénergiques-sérotoninergiques, IMAO non sélectifs, IMAO sélectifs A, linézolide.
Autres produits	X.

