



DOLIPRANE® ; Antalgique de pallier 1 non opioïde.

Indications : Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modéré et/ou des états fébriles.

Traitement symptomatique des douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant à partir de 50kg (environ 15ans).

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	X / PARACETAMOL
Excipient notoire	Azorubine
Contre-indications	Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. Insuffisance hépatocellulaire sévère. Enfant de moins de 6 ans en raison des risques de fausse route.
Fertilité Grossesse Allaitement	Déconseillé. Déconseillé. Possible.
Posologie	Ne pas prendre 2 comprimés car contient déjà le dosage maximum par prise. La posologie unitaire usuelle est d'une gélule de 1000mg par prise, à renouveler au bout de 6 à 8h. En cas de besoin, la prise peut être répétée au bout de 4 heures minimum mais ne doit pas excéder 4g par jour. Voie orale, comprimé sécable.

EFFETS

Attendus	Action analgésique et anti-pyretiques sur le mécanisme d'action central et périphérique du système nerveux dans les 30 à 60 min.
Indésirables	Très fréquent : X Fréquent : X Peu fréquent : X Fréquence indéterminée : érythème pigmenté fixe, anémie hémolytique pour patient avec déficit, agranulocytose, augmentation des transaminase, atteinte hépatique cytolytique, hépatite aiguë ou majeure lors d'une utilisation dans une situation à risque, bronchospasme. Rare : érythème, urticaire, rash cutanée, réaction d'hypersensibilité à type de choc anaphylactique, oedème de Quincke .
Surdosage	Possible si prise TRES élevée.
Conduite 🚗	Possible.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuse	Anticoagulant oraux, résines chélatrices, flucloxacilline, médicaments hépatotoxiques.
Autres produits	X

