



SEROPLEX® ; Antidépresseur sous forme de comprimé sécable (psychotrope).

Indications : Traitement des épisodes dépressifs majeurs. Traitement du trouble de panique avec ou sans agoraphobie. Traitement du trouble "anxiété sociale". Traitement du trouble anxiété généralisée. Traitement des troubles obsessionnels compulsifs.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	ESCITALOPRAM®, sous forme d'oxalate d'ESCITALOPRAM.
Excipient notoire	<i>Noyau</i> : cellulose microcristalline, silice colloïde anhydre, talc, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium. <i>Pelliculage</i> : hypromellose, macrogol 400, et dioxyde de titane(E171)
Contre-indications	Hypersensibilité a la substance active ou à l'un des excipients. Agitation, tremblements, hyperthermie. Pb cardiaque si allongement de l'intervalle QT.
Fertilité Grossesse Allaitement	Impact sur la qualité des spermatozoïdes mais réversible. Déconseillé. Déconseillé.
Posologie	Administré en une seule prise journalière pendant les repas ou à distance de ceux-ci. La posologie usuelle est de 10mg par jour et en fonction de la réponse thérapeutique individuelle, celle-ci pourra être augmentée jusqu'à 20mg. Voie orale, comprimé pelliculé sécable.

EFFETS

Attendus	Généralement, l'effet de l'antidépresseur est obtenu après 2 à 4 semaines de traitement. Après la disparition des symptômes, la poursuite du traitement pendant 6 mois est nécessaire à la consolidation de l'effet thérapeutique.
Indésirables	Apparaît principalement la première ou la deuxième semaine. Très fréquent : céphalées, nausée. Fréquent : perte/augmentation de l'appétit, anxiété, impatience, rêves anormaux, insomnie, tremblement, sensation de vertige, diarrhées/constipation, sécheresse buccale, hypersudation, arthralgies /myalgies, hyperthermie. Peu fréquent : perte de poids, agitation, nervosité, attaque de panique, confusion, trouble du sommeil, syncope, mydriase, trouble visuels, acouphène, tachycardie, épistaxis, hémorragie gastro-intestinale, urticaire, éruption cutanée, prurit, œdème. Fréquence indéterminée : Thrombocytopénie, sécrétion inappropriée d'ADH, hyponatrémie, anorexie, manie, idée/comportement suicidaire, dyskinésies, agitation psychomotrice, allongement de l'intervalle QT, arythmie ventriculaire, hypotension orthostatique, anomalie bilan hépatique, rétention urinaire. Rare : réaction anaphylactique, agressivité, dépersonnalisation, hallucinations, bradycardie.
Surdosage	Pas possible, symptômes sévères peuvent apparaître avec dosage entre 400mg et 800mg par jour.
Conduite 🚗	Pas de certitude sur l'altération psychomotrice et fonctions cognitives mais mise en garde.

INTÉRACTIONS

Médicamenteuse	IMAO non sélectif et irréversible. Au moins 7 jours doivent s'écouler avant la fin d'un traitement par ESCITALOPRAM et le début d'un traitement par IMAO non sélectif et irréversible.
Autres produits	X



