



VIAGRA® ; Inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 (PDE5).

Indications : Hommes adultes présentant des troubles de l'érection. Une stimulation sexuelle est requise pour l'efficacité de celui-ci.

LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	/ SILDENAFIL.
Excipients notoire	Comprimé : cellulose microcristalline hydrogénophosphate de calcium (anhydre), croscarmellose de sodium stéarate de magnésium. Pelliculage : hypromellose, dioxyde de titane (E171), lactose monohydraté, triacétine, laque d'aluminium contenant de l'indigotine (E132).
Contre-indications	Hypersensibilité à la molécule active ou à l'un des excipients, troubles cardiovasculaires sévères (angor instable ou une IC grave), perte de la vision d'un œil due à une neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique, concomitance avec stimulateurs de guanylate cyclase, donneurs de monoxyde d'azote (nitrite d'amyle), avec des dérivés nitrés.
Fertilité Grossesse Allaitement	X. X. X.
Posologie	Adulte : 50mg environ 1h avant l'activité sexuelle. En fonction de l'efficacité/tolérance, peut être adaptée à 100mg ou à 25mg. Dose max est de 100 mg et la fréquence max est 1 fois/j. Privilégié la prise à jeun pour optimiser l'efficacité du traitement. Sujets âgés : Pas d'ajustement n'est requis chez les personnes âgées (≥ 65 ans). Insuffisance rénale : Débuter à 25mg et augmenter progressivement en fonction de la tolérance et l'efficacité en restant vigilant. Insuffisance hépatique : Débuter à 25mg et augmenter progressivement en fonction de la tolérance et l'efficacité en restant vigilant. Population pédiatrique : N'est pas indiqué chez les personnes de - de 18 ans. Patients prenant d'autres médicaments : Ritonavir, inhibiteurs du CYP3A4, alpha-bloquant. Voie orale, comprimé pelliculé.

EFFETS

Attendus	Une érection bien-sûr.
Indésirables	Très fréquent : céphalées. Fréquent : sensations vertigineuses, accélération de la vision des couleurs, perturbation visuelle, rougeur, bouffés de chaleur, congestion nasale, dyspepsie, Peu fréquent : rhinite, hypersensibilité, somnolence, hypoesthésie, troubles oculaires, vertiges, acouphènes, hyper/hypotension, épistaxis, vomissements, douleurs abdos hautes, bouche sèche, myalgie, hématurie, douleur thoracique, sensation de chaleur, tachycardie. Rare : AVC, AIT, crise d'épilepsie, syncope, affections oculaires graves, surdité, mort subite d'origine cardiaque, IDM, Angor, sensation de constriction du pharynx, hémorragie du pénis, hématospermie, érection augmentée, irritabilité.
Surdosage	Céphalées, rougeur de la face, sensations vertigineuses, dyspepsie, congestion nasale, troubles de la vision -> traiter les symptômes.
Conduite	Attention en tournant le volant à ne pas se péter le frein !

INTÉRACTIONS

Médicamenteuses	Inhibiteurs du CYP3A4 (Kétoconazole, Érythromycine, Cimétidine), Nicorandil, Riociguat, Alpha-bloquant, Doxazosine.
Autres produits	Jus de pamplemousse.

