



## XANAX® ; Anxiolytique.

**Indications** : Traitement symptomatique des manifestations anxieuses sévères et/ou invalidantes. Prévention et traitement du delirium tremens et des autres manifestations du sevrage alcoolique.

### LE MÉDICAMENT

Molécule active / DCI	ALPRAZOLAM MYLAN
Excipient notoire	Chaque comprimé contient 92,00mg de lactose monohydraté et 0,10mg de benzoate de sodium.
Contre-indications	- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients, - Insuffisance respiratoire sévère, - Syndrome d'apnée du sommeil, - Insuffisance hépatique sévère, aiguë ou chronique, - Myasthénie.
Fertilité Grossesse Allaitement	Déconseillé. Déconseillé. Déconseillé.
Posologie	Le dosage est réservé aux états anxieux nécessitant une posologie de 2,5 à 3mg par jour pendant une durée très limitée. Le traitement doit être aussi bref que possible avec réévaluation régulière des symptômes. Durant globale du TTT doit être comprise entre 8 et 12 semaines mais ne pas l'excéder et doit être dégressif. Voie orale, comprimé sécable.

### EFFETS

Attendus	Myorelaxante, anxiolytique, sédatif, hypnotique, anticonvulsivant, amnésiant.
Indésirables	Apparaisse en fonction de la sensibilité de l'individu. <b>Très fréquent</b> : dépression, sédation, perte de mémoire, sensation de vertige, céphalées, constipation, fatigue, irritabilité. <b>Fréquent</b> : diminution de l'appétit, confusion, modification de la libido, anxiété, insomnie, nervosité, trouble de l'équilibre et de la coordination, trouble de concentration, tremblements, trouble de la vision. <b>Peu fréquent</b> : hallucination, colère, agitation, excitation, amnésie, vomissement, faiblesse musculaire, incontinence, irrégularité menstruelle. <b>Fréquence indéterminée</b> : Déséquilibre du système nerveux autonome, troubles gastro-intestinaux, fonction hépatique anormale, œdème de Quincke, photosensibilité, rétention urinaire.
Surdosage	Polymédication ou cas de prise massive.
Conduite 🚗	Altération de la vigilance peut rendre dangereuse la conduite de véhicule

### INTÉRACTIONS

Médicamenteuse	Médicaments contenant de l'alcool, Oxybate de sodium, médicaments sédatifs, dérivés morphiniques, neuroleptiques, benzodiazépines, hypnotiques, antihistaminique, anti-hypertenseur centraux, baclofène ou thalidomide, opioïdes.
Autres produits	Alcool (boisson ou excipient)

